

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَاتٍ
 مِنْكُمْ لِتَاكْفُرُوا عَنْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُنِيعٌ

Aid to wife

CHECKED

Checked
1987

صحت النساء

CHECKED 1995

جناب ڈاکٹر سیّد عزیز الدین صاحب متوطن شہر فرخ آباد

باجہ تمام خاکسار محمد عونا تیلان

ماہ دسمبر ۱۹۱۱ء

حسب فریاض جناب ڈاکٹر صاحب موصوف

طبع مئی مئی طبع ہوتی

کاپی رائٹ محفوظ

فہرست مضامین صحت النساء

صفحہ	نام مضامین	صفحہ	نام مضامین
۹۵	قوی عورت کے صبح خیز کے علامات		الف
۹۵	علاج	۷	آگ سے سینکنا
۹۶	قسم دوم حیض کا کچھ مدت کا تاری بہرہ بند ہونا		امرا۔ اور غریب عورت کے طرز معاشرت
۹۶	اسباب	۸	اور ان کے نتائج۔
۹۶	علامات	۵۷	ایام حل
۹۶	علاج	۵۲	استقاط حل
	قسم چہارم علمی رکاوٹ یا مرض کے سبب	۵۲	اسباب
۹۷	حیض بند ہو جانا	۵۲	علامات
۲۱	قسم پنجم جس میں حیض بہ سبب زیادتی عمر	۵۳	درجے
۲۲	علامات	۵۳	استقاط ہونے کے ایام
	ب	۵۴	علاج
۱۳	بیجا عورت کا شادی نہ کرنا	۹۲	امراض رحم
	بچہ کا بے حس و حرکت مثل مردہ کے	۹۲	ایمنیوریا یعنی احتباس حیض
۶۶	پیدا ہونا۔		قسم اول حل اور دو ڈپلا کے سبب جے جے ہونا
۶۶	علاج		قسم دوم عورت کا
۶۷	مصنوعی سانس ہونا	۹۳	حیض کی عمر تک پہنچ کر حیض نہ آنا۔
۶۸	بچہ کے نال یا نہ ہونے کی ترکیب	۹۳	علامات
۶۸	بچہ کے آنول نکالنے کی ترکیب	۹۴	علاج

Checked
1987

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۰	قسم اول	۶۶	بعد ولادت بچہ کا معائنہ
۸۱	قسم دوم	۷۶	بچہ کا پیر کے رخ پیدا ہونا
۸۱	علامات	۷۶	بچہ کا ماتھے کے رخ پیدا ہونا
۸۱	علاج	۷۱	بچہ کا کولہ کے رخ پیدا ہونا
	پستانوں میں دودھ بہا ہونا اور بچہ	۷۱	تو ام یحییٰ دو بچوں کا ایک ساتھ پیدا ہونا
۸۰	کا نہ پینا		پ
۸۰	علاج	۷۹	پستانوں سے دودھ ٹپکتا اور علاج
۸۵	پستانوں سے دودھ خشک کر نیکی ترکیب	۹۰	پیو آرمیرل فیو یونی رجب کا خطرناک بیمار
	ت	۹۰	علامات
۵	تفریح اور ہوا خوری	۹۰	علاج
	تنگ مکائین بہتے لوگوں کیساتھ	۱۰۸	پستان میں سرطان ہو جاتا
۸	ہے کا ضرر	۱۰۸	علامات
۷۸	تنگ محرم پہننے کا ضرر اور اس کا علاج	۱۰۹	رسولی سے فرق
	ح	۱۰۹	علاج
۱۱	حیض اور اس کے فوائد	۸۲	پستان کا پھوٹا
۱۳	حیض آنے کے ایام	۸۳	علامات
۱۳	حیض کے خون کی مقدار	۸۳	علاج
۱۲	حائضہ ہونے کی عمر	۸۰	پستانوں کا پک جانا
۱۲	حائضہ ہونے کی مدت	۸۰	اسباب
۱۵	حائضہ کو کس کس بات سے بچنا چاہیے	۸۰	اقسام


صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	علاج	۱۶	حائضہ کا کمزور ہونا اور خون چھینکے بغیر
۳۴	حاملہ کا تشنج	۱۶	حیض میں فتور واقع ہونا اور اس کی قیام
۳۴	علاج	۱۷	حیض کا باقاعدہ ہونا
۳۵	حاملہ کی خراش اور خارش		حائضہ کو فتور حیض میں جلد علاج کرنا
۳۵	اسباب	۱۶	چاہیے۔
۳۵	علاج	۲۶	علامات حمل
۳۶	حاملہ کی غنودگی	۲۶	حیض کا بند ہو جانا
۳۶	حاملہ کے سینہ کا جلنا	۲۷	متلی
۳۷	علاج	۲۸	علاج
۳۷	حاملہ کے منہ میں پانی بہر آنا	۲۹	بتانون کا بڑھنا
۳۷	علاج	۳۰	شکم میں بچہ کا متحرک ہونا
۳۸	حاملہ کی بھینتی	۳۱	یالیدگی شکم
۳۸	علاج	۳۱	ناف کا پھول جانا
۳۸	حاملہ کو تھوک زیادہ آنا	۳۱	حاملہ کا لاغر ہو جانا
۳۹	حاملہ کی اشتہا کا موقوف ہو جانا	۳۱	بار بار پیشاب کا آنا
۳۹	حاملہ کو بعض چیز کے کھانے کی رغبت	۳۲	علاج
۳۹	حاملہ کی بد مزاجی	۳۳	بچہ کے دل کی حرکت
	حاملہ کو بعض کھانے سے رغبت اور	۳۳	حاملہ کی غشی
۳۹	بعض سے نفرت	۳۳	علاج
	حاملہ کے چہرے اور گردن پر دانے	۳۴	اختلاج قلب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۱	حاملہ کا سونا	۳۵	نکل آنا
۴۵	حاملہ کا راحت و آرام		حاملہ کے معدے اور امعاء میں
۵۱	حاملہ کو درد شکم ہونا	۳۵	ہوا بہر جانا۔
۴۷	حاملہ کی ہوا خوری	۳۵	حاملہ کی بواسیر
۲۱	جس حقیقت کے اسباب	۴۷	علاج
	د	۴۲	حاملہ کے پیر ونگی گین بھول جانا
۲	دیباچہ	۴۲	علاج
۶۸	دودھ پلانے کی حالت میں حائضہ ہونا	۴۲	حاملہ کے شکم کی کھال کچھ جانا
۵۶	دروزہ کا ذب	۴۲	علاج ۶
۵۶	دروزہ کا ذب کا اصلی دروزہ سے قرق		حاملہ کے دانتوں کا خراب ہو جانا
۵۶	علاج	۴۳	اور درد ہونا
۵۹	دانی کیسی ہونی چاہیے۔	۴۳	علاج
۶۳	دروزہ اور اسکی کیفیت	۴۴	حاملہ عورتوں کا ضروری علاج
۶۲	دروزہ میں مثلی اور قحط کا ہونا	۴۵	اسہال
۶۳	دروزہ میں تشنج کا ہونا اور علاج	۴۵	علاج
	دروزہ کے شروع میں پانی کا نکل جانا	۴۶	حاملہ کا لباس
۶۳	اور درد کا موقوف ہو جانا		حاملہ کے پیر اور دیگر اعضا میں دم
۶۴	دروزہ کی مدت	۴۶	آ جانا
۶۳	دروزہ کی حالت میں کوئٹہ نا	۴۷	حاملہ کا غسل
۷۴	دودھ پلانا	۴۹	حاملہ کی غذا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۹	علاج	۷۵	دودھ پلانے کی ترکیب
	ط	۷۵	دودھ پلانے کے اوقات
۹۷	ہسٹینوریا یعنی عسرت الحیض	۷۶	دودھ پلائی کی غذا
۹۷	اسباب		غذا کا اثر دودھ پر
۹۷	علامات		مزلج کا اثر دودھ پر
۹۸	علاج	۷۸	دودھ پلائی کے امراض
	ر	۷۹	ہسٹینون کا زخم یا خراش
۹	روشنی اور دھوپ کے فوائد	۷۹	علاج
۸۷	رحم سے خون جاری ہونا	۷۹	ہسٹینون میں درا رین پڑ جانا
۸۷	قبل از ولادت	۷۹	علاج
۸۷	علاج		دودھ پلائی کی واسطے قبض کشادہ
۸۷	بعد از ولادت	۸۳	اور تلبیر
۸۸	علاج	۸۴	دودھ چھڑانا
۱۰۵	رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	۸۵	دودھ چھڑانے کی ترکیب
۱۰۵	اسباب	۸۵	اسباب جسے مجبوراً دودھ چھڑنا پڑتا ہے
۱۰۵	علامات	۸۵	پستانوں سے دودھ خشک کر دینے کی ترکیب
۱۰۶	علاج	۸۶	دودھ پلائی کا حاملہ ہو جانا
۱۰۶	رحم کا زخم	۸۶	دودھ کے فوائد
۱۰۷	اسباب	۸۹	دودھ کا بخار
۱۰۷	علامات	۸۹	علامات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۳	علاج	۱۰۷	علاج
۱۰۴	سوزش رحم مزمن	۱۰۷	زچہ کا لباس
۱۰۴	علامات	۶۵	زچہ کے شکم پر پٹی باندھنا
۱۰۴	علاج	۶۹	زچہ کو آرام سے لٹائے رکھنا
۵۹	شکم مادرین لڑکا یا لڑکی	۶۹	زچہ کو پیشاب کرانا
	ص	۷۰	زچہ کے قبض شکم کا علاج
۵	صحت قائم رکھنے اور بار آور ہوئی کی تدابیر	۷۲	زچہ کی دیوانگی
	ع	۹۲	علامات
۱۰	عورت نیک مزاج اور نیک طبیعت	۹۲	علاج
۱۱	عورت بد مزاج اور بد طبیعت	۹۲	انجام
۱۲	عورت کی شادی کس عمر میں ہونا چاہیے	۲۱	زیادہ عمر کی عورت کے حمل کی خاص علامات
۱۱	علی الصباح اٹھنا		امراض رحم اور زیادہ عمر کی عورت کے
۱۲	عورت کا باخجہ ہونا	۲۱	حمل سے فرق
۱۹	علامات باؤ گولہ		س
۱۹	اسباب	۱۲	سین بلوغ
	غ	۷	سستی اور کاہلی
۵	غسل کرنا	۱۰۲	سوزش رحم حاد
۴۰	غسل کرنے کی ترکیب	۱۰۲	علامات
۷۲	غذا بعد وضع حمل	۱۰۳	اسباب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۸	گلے کی ملائم بناوٹ میں ہوا بہر جانا	۹۱	فلکیسیا ڈولنس
۸۸	علامات	۹۱	علامات
۸۸	علاج	۹۱	علاج
۳۸	مکان کا صاف اور ہوا دار ہونا	۱۷	فم رحم اور اندام نہانی سے سفیدی کا آنا۔
۲۶	مریض عورتوں کو ہدایت	۱۷	علامات
۳۸	ناک کے فوائد	۱۷	اسباب
۷	نفسہ منجن	۱۷	علاج
۳۷	نفخ شکم اور حمل کا فرق	۱۸	فتور حیض کے سبب ولاد کا ہونا
	نقشہ مقدار توراک اور وہ ہوائی		کثرت الحیض
۱۱۱	عمر مریض	۹۹	اقسام
۱۱۰	نقشہ اوزان	۹۹	قسم اول قوی عورت
۶۰	وضع حمل کی تیاری	۱۰۰	علامات
۶۱	وضع حمل کی احتیاط	۱۰۰	قسم دوم کمزور عورت
۶۵	وضع حمل ہونا	۱۰۰	علامات
۶۹	وضع حمل کے بعد زچہ کو سردی اور لرزہ معلوم ہونا۔	۱۰۰	اسباب
		۱۰۰	علاج ہر دو اقسام



نسخه
۸
۱۱

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Aid to wife

موسوم بام

صحت النساء

من تالیف

جناب ڈاکٹر سیّد عزیز الدین صاحب متوطن شہر فرخ آباد

بہت تمام خاکسار محمد عنایت خان

بمبارہ دسمبر ۱۹۱۱ء

حسب فرمائش جناب ڈاکٹر صاحب موصوف

مطبع ہری بی بی مین طبع ہری

کاپی رائٹ محفوظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے عورتوں کو انسانوں کی مائیں بنایا اور انیا اولیا
فلاسفر حکماء سب کو عورتوں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اور دروہے جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر جنون ہو کر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک و تربیت اور ہر قسم کی خبر گیری کی تاکید فرمائی اب
مردوں کا فرض یہ ہے کہ عورتوں کی تندرستی کا خیال رکھیں انکو صحت قائم رکھنے کے طریقے
بتائیں کیونکہ تندرستی نہیں تو دین و دنیا دونوں کے کام انجام نیکین گی۔ اور اولاد اول تو ہوگی
نہیں اور اگر ہوئی تو بیمار نحیف ہو کر فنا ہو جائیگی۔ اور اگر زندہ بھی رہی تو بیکار و بے مصرف۔
لہذا عورتوں کا تندرست ہونا دنیا کی آبادی اور ترقی کے واسطے بہت ضرور ہے۔

اقس ہے کہ ہندوستان کی عورتیں عموماً اپنی صحت قائم رکھنے کی قابلیت نہیں رکھتیں اس
لئے اکثر عورتیں خصوصاً امیرزادیاں ہمیشہ بیمار رہا کرتی ہیں اولاد بھی انکے کم ہوتی ہے ہر وقت
طیب کی محتاج رہتی ہیں اور زچہ خانہ تو گویا موت کا سامنا ہے اگر زچہ خانہ سے نہاد ہو کر اٹھ کھڑی
ہو تو بے دوبارہ زندگی پائی کیونکہ بے پرداہی اور نادانسی سے ایسے غلطی کر گزرتی ہیں کہ جس کا نتیجہ خراب
ہوتا ہے۔

بقسمتی سے دیسی زبان میں کوئی ایسی کتاب بھی نظر سے نہیں گذری جس میں عورتوں کے
امراض کا سہل علاج اور احتیاطین درج ہوں کہ جسکو پڑھ کر خود ہی بیان اپنا علاج آپ کر لیں

اور بے احتیاطی سے نقصان نہ اٹھائیں۔ اس عاجز مسکین ڈاکٹر سعید عزیز الدین متوطن
فرخ آباد نے اس ضرورت کو محسوس کر کے یہ کتاب صحت النساء سلیس اردو زبان میں
نہایت کوشش سے لکھی اس کتاب میں اُن تمام بیماریوں کا جو عورتوں کو لاحق ہوا کرتی
ہیں بیان و علاج سہل و آسان درج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو مقبول
کرے اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین

نیا اولیا

نہ صلی

ناب

یقے

تا ہو گیا

رف

میں اس

ہر وقت

کراٹھ کھڑی

کا نتیجہ خراب

توں کے

آپ کر لین



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعد حمد و نعت کے واضح ہو کہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کا شکر ہرگز ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر تندرستی نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز کارآمد نہیں۔ تندرستی کے مقابلہ میں تخت شاہی بھی بیچ ہے۔ بقول میاں فیض بخشہ سخن ہیں سب میں ہی ہے سخن درست و اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست و تندرستی کو بہت فضل الہی بوجہ ہے و آبرو سے جگہ میں رہنا بادشاہی بوجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عورات کس قدر کمزور اور سست ہیں اسی سبب سے مختلف امراض میں مبتلا رہتی ہیں انکو معلوم نہیں کہ صحت کیونکر قائم اور بحال رہ سکتی ہے اور کیا کیا تدابیر عمل میں لائی جاویں کہ جس سے یہ مطلب حاصل ہو سکے اور ساری عمر خوشی اور عیش و عشرت سے گزرے۔ اس واسطے ان اوراق میں ہم چند قواعد صحت قائم رکھنے اور بار آور ہونے کے لکھیں گے۔ کیونکہ اکثر عورات بوجہ خرابی صحت بار آور نہیں ہوتیں اور بانجھ رہ جاتی ہیں۔ اور تمام عمر اسی حسرت اور افسوس میں ہاتھ ملتی رہتی ہیں۔

صحت قائم رکھنے کے واسطے چند امور کی ضرورت ہے بلا ان کے صحت قائم نہیں رہ سکتی۔

(۱) علی الصبح اٹھنا۔ گو یہ امر مست اور کابل لوگوں کو جو دن چڑھتے تک سویا کرتے ہیں شروع میں ناگوار معلوم ہوگا۔ مگر رفتہ رفتہ جب صبح اٹھنے کی عادت ہو جاوے گی تو بلا اٹھائے خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ اور بغیر اٹھنے چین نہیں پڑے گا۔ صبح کے اٹھنے سے طبیعت دن بھر چست و چاق رہتی ہے۔

(۲) تفریح اور ہوا خوری۔ مست اور کابل لوگوں کو شروع میں یہ امر بھی ناگوار معلوم ہوتا ہے مگر عادت ڈالینے سے آسان ہو جاتا ہے۔ ہوا خوری بھی صحت کو اچھی ہوتی ہے۔ اس کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے۔ ہوا خوری اس قدر چاہئے کہ ترکان نہو۔ کپلے میلان یا جنگل عورتوں کے واسطے خانہ باغ و پھروہ کی چہل قدمی کافی ہے۔ عورتوں کو چاہئے کہ چل پہر کر خانہ داری کا کام کریں اس سے صحت قائم رہتی ہے۔ اشتہا زیادہ ہوتی ہے۔ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اجابت صاف ہوتی ہے۔ سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ تازہ ہوا سینہ کے اندر جا کر پھیپھڑوں کے خانہ دار بناوٹ کو صاف کرتی ہے دوران خون اچھی طرح ہونے لگتا ہے عضلات جسم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فہم اور ادراک تیز ہو جاتے ہیں دماغ صحیح رہتا ہے کام رغبت سے کیا جاتا ہے۔ نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ رنگ صاف ہو جاتا ہے ہوا خوری کی برابر نہ کوئی مقوی غذا نہ دوا۔

غسل

(۳) ہر روز صبح کے وقت موسم سرما میں گرم پانی سے اور گرما میں سرد پانی سے غسل کرنا چاہئے سرد پانی سے غسل کرنا زیادہ بہتر ہے غسل کرنے سے تمام جسم صاف رہتا ہے۔ پسینہ آتا ہے جبکہ ذریعہ مختلف اندرونی کثافتیں جن کا ٹھکانا ہی ضروری ہے خارج ہو جاتی ہیں۔ امراض جلدیہ نہیں ہونے پاتے جلد کے مسام

س سے ایک
آمد نہیں۔
ن ہیں سب
فصل آبادی
سے ملک
بتلا رہتی ہیں
س میں لائی
نرت سے
رہنے کے
اتی ہیں۔
ایم نہیں

گھل جاتے ہیں ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے طبیعت تروتازہ اور خوش رہتی ہے
اشتہا لگتی ہے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ آلات تنفس مضبوط
ہو جاتے ہیں۔ سر و پانی میں غسل کرنے سے بہتر کوئی مقوی دوا نہیں غسل جلد کرنا چاہئے
اٹھ دس منٹ سے زائد دیر نہ ہو۔

غسل کی ترکیب۔ پہلے پانی اور صابون سے ہاتھ اور منہ دھوئیں کان
اور ناک صاف کریں گھبرا کر دن سینہ اور بازوؤں کو خوب ملکر دھوئیں منہ کے واسطے
اسفنج یا فلائین کا ٹکڑا بہتر ہے۔ چونکہ شانہ پشت اور کمر اپنے ہاتھ سے نہیں دھو سکتے
اسکے واسطے بہتر ترکیب یہ ہے کہ موٹے کپڑے کے پٹریکا مضبوط ٹکڑا ڈیرہ گز لمبا
پانی میں بہگو کر پشت پر ڈالے اور اسکے دونوں سرے پکڑ کر نیچے اور پر دہتے بائیں
خوب رگڑ کر جسم کو پوچھے اس سے وہ مقامات جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا صاف ہو جاتے
ہیں۔ کمزور اشخاص تھوڑا سا کھانے کا نمک غسل کے پانی میں ملا لیا کریں تو اور بھی زیادہ
مفید ہے۔ اس سے جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور طاقت آتی ہے بعد غسل پیرونگو پانی
میں بہگو کر خوب صاف کریں پیرونگی انگلیوں کے بیچ کی جگہ کو کسی کپڑے یا اسفنج سے
رگڑ کر صاف کریں اور پھر خشک کپڑے کے ٹکڑے سے رگڑ کر خشک کر لیں زانو سے نیچے
تمام پیرونگو رگڑ کر صاف کریں۔ وہ حصے جسم کے جو نظر نہیں آتے خوب صاف کر جاویں
تاکہ میل جمع نہ ہونے پاوے۔ جسم میلا رہنے اور پسینہ آنے سے دانے نکل آتے ہیں
پیریاں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے سے جسم کو
خشک کر لیں۔ اسب طرح پیر پاؤں کو بھی صابن اور پانی سے خوب دھو کر صاف کر لیا
کریں۔ بعد غسل دہن یا پندرہ منٹ تک کسی ہوا دار جگہ یا خانہ باغ میں ٹھہریں تاکہ
دوران خون اچھی طرح ہونے لگے اور اشتہا معلوم ہو۔ منہ کے ساتھ دانتوں کو
بھی پانی اور صابن سے خوب مانجھیں اور صاف کر لیں۔ دانت صاف کرنے کے واسطے

بعض منجن بھی زیادہ مفید ہیں چنانچہ ایک نسخہ منجن کا درج ذیل ہے۔

نسخہ منجن

سفوف کا سٹائل سوپ ۲ ڈرام - powdered Castile soap
 سفوف بیخ بنفشہ ۲ ڈرام - powdered orris root 2 drs
 سفوف پیوی بیگینشیا ۲ اونس - powdered Heavy mug
 صاف کی ہوئی کمریاٹی کا سفوف ۲ اونس - powdered prepared
 روغن وینٹر گرین ۱۵ قطرے - Oil of winter green 15
 2 drs 2 ounces 2 ounces

آگے سینکنا

آگ سے سینکنا یا آگ کے پاس بیٹھا رہنا مفید ہے۔ اس سے چہرہ کا رنگ خراب ہو جاتا
 روشن اور چمک دار نہیں رہتا بہور اخاکی اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ آگ کے پاس سے
 اوٹھ آنے کے بعد سردی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی سردی لگ کر بخار آ جاتا ہے۔ سستی
 اور بھمی ہو جاتی ہے۔ طبیعت آداس رہتی ہے صحت خراب ہو جاتی ہے طاقت
 نائل ہو جاتی ہے۔ نظام اعصاب سست پڑ جاتے ہیں۔ معدہ کمزور ہو جاتا ہے ہاتھ
 پیروں میں بوئیاں ہو جاتی ہیں۔

سستی اور کابلی

سستی ہر کام کو بگاڑتی ہے۔ سستی سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ سستی سے بڑھ کر کوئی مفکام نہیں۔
 اگر عورت کی صحت اچھی نہیں تو اولاد کمزور اور دائم المرض پیدا ہوگی۔ بعض عورات اسی
 سبب لاولد رہ جاتی ہیں۔ بعض کو اسقاط ہو جاتا ہے۔ بعض کے مرد بچے پیدا ہوتے
 ہیں بعض بچے موروثی امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور تمام عمر رنج مصیبت ہیگتا کرتے ہیں

ہے
مضبوط
رنا چاہئے

ب کان
واسطے
ہو سکتے
ہ گزلبا
ہتے بائیں

ن ہو جاتے
ور بھی زیادہ

یرونکو پانی
یا سفنج سے

وسے تیچے

صاف کوجاویں

آتے ہیں

سے جسم کو

ر صاف کر لیا

ٹہلیں تاکر

ساتھ دانتوں کو

کرنیکے واسطے

اور اکثر زیادہ عرصہ تک زندہ بھی نہیں رہتے بہر حال بلا صحت زندگی و بال جان ہے بعض عورات سردی لگنے اور پیرھنڈے رہنے کی شاکاں رہتی ہیں۔ سبب یہ ہے وہ اکثر لیٹی بیٹھی رہتی ہیں اشتہا نہیں لگتی۔ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اگر کھائیں تو ہضم نہیں ہوتا کمزور ہو جاتی ہیں۔ اجابت صاف نہیں ہوتی۔ قبض کشادہ اور چورن کی متلاشی

رہتی ہیں۔ اگر چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کی عادت ڈالیں تازہ ہوا میں چلیں پھریں ہلکی زور ہضم غذا معین اوقات میں کھانویں غسل کریں صاف رہیں تو پھر کوئی شکایت نہوگی۔

چھوٹے مکان میں زیادہ لوگوں کا رہنا

تنگ مکان میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ رہنے سے ہوا خراب اور زہریلی ہو جاتی ہے۔ اس میں سانس لینے سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ درود سر ہو جاتا ہے۔ دماغ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ خیالات منتشر رہتے ہیں اشتہا جاتی رہتی ہے۔ اُمر کی عورات اکثر عیش و آرام میں رہنے کے سبب سُست اور کال ہو جاتی ہیں خود چل پھر کر کام نہیں کرتیں نوکروں پر بیٹھی بیٹھی حکومت کرتی ہیں۔ اُنکو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ نوکروں نے تعمیل حکم بھی کی یا نہیں اسوجہ سے ہمیشہ علیل رہتی ہیں۔ اُسے دن ڈاکٹر اور حکیم کی تلاش رہتی ہے ایک ہفتہ بھی بلامد و اخالی نہیں جاتا۔ ایسی عورتوں کے یا تو اولاد ہوتی نہیں۔ اور ہوتی بھی ہے تو کم اور وہ بھی کمزور بخلاف غربا کے۔ کہ انکی عورات سب کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں چلتی پھرتی ہیں بلکہ محنت اور مشقت سے اوقات بسر کرتی ہیں۔ اُنکو حکیم ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسی عورات کثیر الاولاد ہوتی ہیں۔ اور اُنکے بچے قوی اور تندرست ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ دو لمبند بے اولاد۔ غریب با اولاد۔ مستی اور علامت۔ جفاکشی اور صحت۔

نمیدہ۔ جو عورت چل پھر کر کام کاج کرتی رہے۔ اُسکو اچھی نیند آتی ہے۔ اُمر کی بنیادیں بہت کم کام کرتی ہیں۔ اُنکی نیند بھی گھری اور میٹھی نہیں ہوتی۔ غریب کی بی

دن بھر محنت شقت کرتی رہتی ہیں۔ رات کو خوب نیند بہر آرام سے سوتی ہیں۔ خواہ پیٹ
بہر کر کہا ناٹے یا نہ لے۔ جو عورت دن کو زیادہ چلتی پھرتی خانگی کاروبار کرتی محنت
مشقت کرتی رہتی ہو۔ وہ کھانا بھی اچھی طرح کھاتی ہے اور پیر کو پھیلا کر خوب سوتی
ہے اور صبح کو تندرست چست چالاک اُٹھتی ہے نیند بھر سونا خدا کا بڑا احسان
ہے اس سے تندرستی قائم رہتی ہے دماغ صحیح رہتا ہے کام کاج خوب ہوتا ہے
طبیعت تازہ رہتی ہے سستی کا ہلی پاس نہیں آتی۔ حالت مرض میں جب مریض
نیند بھر سوجاتا ہے تو مرض بھی جاتا رہتا ہے صحت ہو جاتی ہے۔ بے قراری جاتی
رہتی ہے قرار آ جاتا ہے۔

روشنی اور دھوپ

روشنی زندگی کا باعث اور صحت کا سبب ہے۔ خوبصورتی اور آرام کا ذریعہ ہے سوج
زندگی بخش ہے فرض کرو اگر سورج نہ ہو تو تمام مخلوق مر جاوے۔ کوئی جان دار چیز
یا درخت بلا روشنی قائم نہیں رہ سکتا۔ روشنی سے بہت امراض جاتے
رہتے ہیں جو دوا سے صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ روشنی سے خوبصورتی آتی ہے
رخسارے گلاب کے بھول کی مانند ہو جاتے ہیں۔ چہرہ روشن رہتا ہے دل خوش
رہتا ہے خفقان دور ہو جاتا ہے۔ کمروں کی کھڑکیاں کشادہ رہیں۔ تاکہ ہر گوشہ
مکان میں دھوپ آوے اور اگر کسی پودہ کو دھوپ اور روشنی نہ لگے تو وہ کُلا جاتا ہے
اسی طرح ہر انسان کو روشنی نہ ملے اور تاریکی میں رہے تو چہرہ کُلا
جاتا ہے دھوپ سے اوکھن

Oxygen

ہوا۔ (مادہ حیات) خون میں داخل ہوتی ہے۔ روح اور جسم کو تازہ کرتی
اور طاقت بخشتی ہے۔ اگر دھوپ اور روشنی نہ ملے تو جسم نہیں بڑھتا نظر دھندلی
ہو جاتی ہے۔ انسان مردہ دل ہو جاتا ہے۔ معدن کہو دنے والے مزدور جو عرصہ

ض
ط
بی
ہوتا
شی
ی
یت

باقی

اکام

رت

عام

روں

رجیم

اولاد

سب

سری

اور

بغیر

آمرکی

لیلی

تنگ زمین کی تہ میں رہتے ہیں اکثر نہیں بڑھتے۔ قیدی جو برسوں تک کال کو ٹھری
 میں بند رہتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اندھیرے مکانوں میں رہتے ہیں
 خطی ہو جاتے ہیں۔ مکانوں کے کمرے دھوپ سے صاف ہو جاتے ہیں۔
 پیوندی نہیں لگنے پاتی بونہیں آتی۔ اس واسطے ہوا روشنی اور دھوپ ہر گوشہ
 مکان میں آنا چاہئے۔ غلیظ اور مستحق مقامات دھوپ اور ہوا سے پاک اور صاف
 ہو جاتے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی دافع عفونت اور صاف کرنے والی شے نہیں۔
 باوجود اسکے کہ یہ چیزیں تمام غلظت اور کثافت کو صاف کر دیتی ہیں۔ مگر خود غلیظ
 اور کثیف نہیں ہوتیں جیسی پاک صاف تہیں ویسے ہی رہتی ہیں۔ جن مکانوں
 میں دھوپ نہیں آتی ان کے کپڑے مچھلے ہوئے پیلے اور ست ہوتے ہیں۔
 اور ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا یہ لوگ چمکے ہیں۔ روشنی کی کرنیں جو
 روشندانوں میں سے کمرہ کے اندر آتی ہیں کیسی خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور
 مکان کو نمونہ بہشت بنا دیتی ہیں غریب اور امیر دونوں کے واسطے برابر ہیں۔
 مزید براں سب سے باریک باریک نباتاتی زندہ جاندار جنکو جرس کہتے ہیں
 جسم میں داخل ہو کر خون اور دیگر ساخت ہائے جسم میں پھست ہو کر بڑھتے
 رہتے ہیں۔ جن سے اکثر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مگر روشنی اور ہوا دونوں
 یکساں مادہ کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں اور کوئی مرض نہیں ہونے پاتا۔
 جو عورت گھر میں نہیں بیٹھتی اور ہر آدھرنانچ تماشہ دیکھتی پھرتی ہے۔ گھر
 کی پروا نہیں کرتی وہ بالکل گھر کی قدر نہیں جانتی ایسی عورت کی عقل اور محنت
 دونوں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اچھی بی بی کم گو۔ خوش مزاج۔ خوش طبع۔ ہند
 طبیعت۔ خوش چلن۔ خوش اسلوب۔ اپنے خاوند کی فرماں بردار ہوتی ہے
 گھر کا کام خود کرتی ہے۔ یا اپنے روبرو کراتی ہے۔ ایسی بی بی سے گو کیسا ہی بد

مزاج خاوند ہونیک طبیعت ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ خاوند جسکی بی بی ایسی ہو۔ بد مزاج بد زبان بد سلیقہ خود غرض نافرمان ایسی بی بی اپنے خاوند کے حق میں زہر ہلاہل ہے اور ایک خار ہے جو جسم میں چھپا ہے ایسی بی بی نہ خود خوش رہ سکتی ہے نہ دوسرے کو خوش رکھ سکتی ہے، ہمیشہ غموم اور بیمار سی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی عارضہ اُسکے پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ اس سبب سے کمزور ہو جاتی ہے صحت قائم رکھنے اور بار آور ہونے کے واسطے اور تمام عمر عیش و راحت میں گزارنے کے واسطے چند تداویر درج ذیل ہیں جن سے بہتر دنیا بھر میں کوئی اور نہیں شروع رات میں سونا۔ صبح کو اول وقت اٹھنا۔ صبح کو غسل کرنا۔ یہی اور سادی غذا کھانا۔ سرو اور کھلے ہوا دار مکان میں رہنا۔ غلی الخوص شب ناشی کا کمرہ ہوا دار ہو۔ تازہ ہوا میں ہوا خوری کرنا۔ چلنا پھرنا۔ ہاتھ پیریں سے کام لینا دل خوش رکھنا زندہ دل رہنا۔

حص

عورتوں کے متعلق حیض ایک بڑی ضروری چیز ہے صحت اور زندگی بلکہ موت
پہنچنے کا سارا مدارِ صحت اسی ایک چیز پر منحصر ہے اگر حیض باقاعدہ اور تندرستی کا
سائوے تو اسکی تندرستی اور خوش حالی کا باعث ہے اور اگر اسکے خلاف ہے
تو علالت اور بد نصیبی کا سبب ہے اگر عورت کا رحم تندرست ہے تو حیض بھی
باقاعدہ اور تندرستی کا سا ہوگا اس صورت میں اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے پس
جس خاوند والی عورت کا حیض صحیح ہے تو اسکا رحم بھی صحیح اور تندرست ہوگا
جب رحم تندرست ہے تو وہ خود بھی تندرست ہوگی۔ جب خود تندرست
ہے تو اولاد بھی ضرور ہوگی۔

ری
سپین
شہ
عنا
سیا
کاپی
بیر
بادر
با-
ہیں
میتے
وں
گھر
محنت
چھتہ
نایاب
مایہ

جب لڑکی حائضہ ہونے لگے تو معلوم کرنا چاہئے کہ بالغ ہو گئی اب اگر حیض باقاعدہ ہو معمولی وقت پر اور مقدار مناسب میں ہوتا رہے رنگ اور دیگر حالات بھی اُس کے ہیک اور درست ہوں تو سمجھا جاوے گا کہ حاملہ ہونے کے قابل ہوگی۔ چاند کے چہینے کے حساب سے ہر چہینے میں اٹھائیس دن روز مقررہ وقت پر حیض شروع ہوتا ہے حکماء نے عورت کے تین زمانہ قرار دیئے ہیں۔ اول پیدائش سے حائضہ ہونے تک دوسرا وہ زمانہ جس میں باقاعدہ حیض ہوا کرتا ہے۔ اور اسی زمانہ میں اولاد بھی ہو کرتی ہے۔ تیسرا وہ زمانہ جس میں عورت کا حیض ہمیشہ کو بند ہو جاتا ہے اور اولاد ہونی موقوف ہو جاتی ہے۔

بعض عورات بانجھ ہوتی ہیں اُن کو حیض نہیں آتا اور نہ اولاد ہوتی ہے تجربہ سے پایا گیا ہے کہ ہر دس عورات میں ایک بانجھ ہوتی ہے۔

اول زمانہ بلوغ کا حیض شروع ہوتے ہی عورت کی حالت بدل جاتی ہے۔ جسم میں تروتازگی اور فزہی آجاتی ہے عقل تیز ہو جاتی ہے لڑکپن جاتا رہتا ہے عورت پن آجاتا ہے اور حاملہ ہونے کی بھی قابلیت آجاتی ہے یہ سب باتیں تیس چوبیس سال کی عمر تک بڑھتی رہتی ہیں اور عورت خانہ داری کے قابل ہو جاتی ہے اس عمر میں اگر شادی کی جاوے تو اولاد اچھی اور تندرست ہوتی ہے کم عمر میں شادی کرنے سے عورت کمزور رہ جاتی ہے اور اولاد بھی کمزور ہوتی ہے۔ پس چاہئے کہ جب تک عورت کی عمر بیس سال کی نہ ہو جاوے شادی نکریں زیادہ عرصہ تک بیٹیر نا بھی مناسب نہیں کیونکہ تیس سال کی عمر میں اندرونی اعضا سخت ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں شادی کرنے سے پہلوئی کے وضع حمل میں دیر لگتی ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کمزور ہو یا امراض قلب میں مبتلا ہو یا اس سے پہلے مبتلا ہو چکی ہو یا مرض گوریا *gonorrhea* یا سرخ بنجاریا *gonorrhea* خج

مخاض میں مبتلا ہو چکی ہو تو بلا مشورہ لیڈی ڈاکٹر شادی نہ کریں اگرچہ بعض امراض قلب حمل یا وضع حمل کو مضر نہیں ہوتے مگر بعض بہت مضر ہوتے ہیں بعض امراض قلب ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھی علامات حمل بڑھنے تک مخفی رہتی ہیں۔ مگر بعد میں ظاہر ہوتی ہیں مرد کو بھی چاہئے کہ جس عورت کی صحت اچھی نہ ہو یا اُس کے خاندان میں کوئی موروثی مرض چلا آتا ہو تو اُس سے شادی نہ کرے۔ کمزور والدین کی اولاد کمزور بیمار والدین کی اولاد بیمار۔ نازک مزاج والدین کی اولاد نازک مزاج ہوتی ہے۔ اسی طرح پر سیاہ فام والدین کی اولاد سیاہ فام۔ گورے رنگ والوں کی گوری ہوتی ہے۔ اور یہ بات پشت با پشت تک برابر چلی جاتی ہے کمزور اور بیمار لوگوں کی شادی نہ کرنا چاہئے ورنہ بجائے آسائش کے تکلیف کا سامنا ہو گا۔ اور بیماری اور کمزوری نسل در نسل جاری رہیگی اور بے گناہ اولاد ہمیشہ صحت میں مبتلا رہیگی شریف النصب اور شریف الطبع کا ہونا دنیوی دولت اور دنیوی مراتب سے بالاتر ہے۔

اکثر تو ہر چھ مہینے میں ایک مرتبہ ایک ہی دن ایک ہی وقت پر حیض آتا ہے مگر بعض تیسرے ہفتہ آتا ہے حیض اکثر تین سے پانچ دن تک رہتا ہے مگر بعض کو ایک ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک رہتا ہے۔ بحساب اوسط ہر حیض میں چار سے چھ اونس تک (Ounce) خون خارج ہوتا ہے۔

اکثر عورت تیرہ سال کی عمر سے سولہ سال تک کی عمر میں حائضہ ہوتی ہیں مگر کبھی سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں حائضہ ہوتی ہیں۔ شہرات کی لڑکیاں جلد اور دیہات کی دیہات میں حائضہ ہوتی ہیں اسی طرح پر عیش و آرام میں پلنے والیاں بہ نسبت ان کے جو سادہ طور پر زندگی بسر کرتی ہیں جلد حائضہ ہوتی ہیں۔ سر و ملک میں عورت دیہات میں حائضہ ہوتی ہیں یعنی بیس اور تیس سال کی عمر کے مابین

قاعدہ

کے

چھینے

تک

تک

اکرتی

ہوتی

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ہے

ایسی عورتوں کو سال بھر میں صرف تین یا چار مرتبہ حیض آتا ہے اور خون کی مقدار بھی کم ہوتی ہے جو لڑکیاں عیش و آرام سے رہتی ہیں ناول اور عاشقانہ قصہ کھانسیا اور داستانیں پڑھتی اور شہتی رہتی ہیں جلد حائضہ ہوتی ہیں۔ اور اسی عمر میں حاملہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس ملک کی لڑکیاں گاہ گاہ دسل یا گیارہ برس کی عمر میں حائضہ ہو جاتی ہیں اور اسی عمر میں حاملہ بھی ہو جاتی ہیں مگر انکی سیساو حیض بھی جلد ختم ہو جاتی ہے اور تین سال کی عمر میں بڑھاپا آ جاتا ہے۔

لڑکی جب پہلے پہل حاملہ ہوتی ہے تو شرماتی ہے اور ملحدہ رہنا پسند کرتی ہے۔ اور ایسا لباس پہنتی ہے کہ لوگوں کو اس کا حاملہ ہونا ثابت نہ ہو۔

حیض کا خون ظاہر میں خون معلوم ہوتا ہے مگر دراصل خالص خون نہیں ہوتا جو جم کر بوتھرا بن سکے جیسا کہ اصلی خون جم کر بوتھرا بن جاتا ہے حالت صحت کے حیض میں خون کا رنگ سرخ چمک دار مثل اصلی تازہ خون کے ہوتا ہے۔ حیض کا خون درحقیقت رحم کی رطوبت ہے اگر حیض باقاعدہ جیسا کہ چاہئے معمول کے موافق آتا ہے تو تندرستی اور بہبودی کی علامت ہے بخلاف اسکے علالت اور رنج کی علامت ہے۔

اگر باقاعدہ حیض آتا ہو تو غالباً عورت جلد حاملہ ہوگی شاذ و نادر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جبکہ کبھی حیض نہیں آیا وہ بھی حاملہ ہو گئی جنوبی ایشیا کے بعض مقامات میں بارہ سال کی عمر میں وضع حمل ہوا ہے۔

حمل میں اور رضاع۔ یعنی دودھ پلانے کی حالت میں اور نہایت طفا بہت میں اور بعض شدید امراض خصوصاً مرض سل میں حیض بالکل نہیں آتا۔

بعض عورات ایام رضاع میں حائضہ ہو جاتی ہیں۔ تجربہ سے پایا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت میں سے نصف عورات دسل بارہ ماہ تک بالکل حائضہ نہیں

ہوتیں۔ بخند ان کے چہارم ایسی ہوتی ہیں جنکو معمولی طور پر باقاعدہ حیض ہوتا ہے اور چہارم ایسی ہوتی ہیں جنکو خلاف معمول غیر مقررہ وقت میں ہوتا ہے۔ جن عورتوں کو ایام رضاع میں حیض بالکل نہیں ہوتا وہ نہایت اُن کے جن کو حیض ہوتا ہے، حاملہ نہیں ہوتیں اور جن کو ایام رضاع میں باقاعدہ حیض ہوتا ہے نہایت اُن کے جن کو ایام مذکور میں سے قاعدہ ہوتا ہے حاملہ ہو جاتی ہیں۔ ایام رضاع میں ماضیہ ہونے سے عورت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا وودہ بھی ناقص ہو جاتا ہے۔

ایام حیض میں سخت مشقت کرنا برت کر پینا سرد پانی سے یا تھک پیر و نکاد ہونا یا غسل کرنا نہایت مضر ہے۔ گرم پانی سے غسل کرنا منع نہیں۔ حیض کے ایام کو خفیف سمجھ کر بے اعتدالیاں کرنا اچھا نہیں۔ جیسے افسوسناک امور پیش آنا ممکن ہے قبل شروع ہونے ایام حیض کے اور نیز دوران حیض میں بعض اوقات سخت درد ہوتا ہے اور جب تک درد موقوف نہ ہو اکثر حمل نہیں ٹھیرا پس ایسی حالت میں لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر مریض کا معائنہ کرایا جاوے۔

بعض بیلی یا بیجی رنگ کی کمزور مردہ کی مانند نوجوان عورت جس کو خون حیض یا تو بہت کم آتا ہے یا بہت زیادہ یا بالکل نہیں آتا اور ادنیٰ صدمہ سے دم پھولنے لگتا ہے یا تھوڑا سا چلنے یا زینہ پر چڑھنے سے سانس چڑھ جاتی ہے مریضہ تھک جاتی ہے اور خستہ آجاتی ہے اگر ایسی مریضہ کا معقول علاج کیا جاوے تو تندرست ہو جاتی ہے اس واسطے مناسب ہے کہ فوراً لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا جاوے کمزور لڑکیاں جن کا چہرہ پہیکا ہوتا ہے اور خون حیض بہت کم ہلکے یا پیچھے رنگ کا ہوتا ہے اُن کا فوراً لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کر اگر علاج کراویں اور جب تک پوری سخت نہ ہو علاج جاری رکھیں۔ اگر علاج میں تاخیر ہوگی تو مرض مسل کا

علاج
حائضہ
عالمہ
نہضہ
جلد
ہوتا
سے
خس کا
کے
ت اور
تھا گیا
ت میں
ت میں
کرد و
نہیں

اندیشہ ہے ایسی عورات جب تک بالکل تندرست نہ ہو جاویں ہرگز شادی نہ کریں۔

جب کوئی نوجوان لڑکی خواہ بیابھی ہو یا کنواری چہرہ پیلا ہوا اور نہایت کمزور ہو اور خون حیض کم آتا ہو یا زیادہ گرد و نون صورتوں میں فن کارنگ بہت پھیکا ہو یا بالکل پانی کی مانند ہو اور مریضہ کو عصبی علامات یا باؤ گولہ کی علامات لاحق ہوں تو فوراً لیڈی ڈاکٹر سے علاج کراویں۔ ایسی مریضہ کو صحت ہو جاتی ہے۔ مگر جب تک پوری صحت نہ ہوئے اور کافی طاقت نہ آ جاوے۔ ہرگز شادی نہ کریں۔ کیونکہ حاملہ ہونے کے بعد وضع حمل کی طاقت نہیں ہوگی اور انجام خراب ہوگا۔

اگر کسی عورت کو پیلے رنگ کا خون حیض آتا ہو خواہ کم ہو یا زیادہ یا خون حیض نہ تو بہت آتا ہو نہ بار بار مگر اور طرح مریضہ علیل رہتی ہو یا حمل نہ ٹھیرتا ہو تو ان سب صورتوں میں لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں ہرگز دیر نہ کریں تاکہ مرض بڑھ نہ جاوے۔

اگر کسی عورت کے ایام بالکل بند ہو جاویں اور مریضہ کی صحت بالکل اچھی اور توانہ ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے امتحان کراویں تاکہ جس حیض کا سبب دریافت کر کے علاج کیا جاوے۔

جب خون حیض بکثرت آتا ہو تو فوراً لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں ویر نہ ہو۔ کیونکہ ایسی حالت میں اکثر اوقات سخت قسم کا مرض رحم میں پایا جاتا ہے۔ اور شروع میں علاج سے صحت ہو جاتی ہے ویر ہونے سے علاج کا وقت گزر جاتا ہے۔

اگر خون حیض زیادہ مقدار میں آتا ہو یا زیادہ عرصہ تک آیا کرتا ہو یا بار بار آتا ہو ان سب صورتوں میں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ مریضہ کی جان تلف ہو جاوے۔

یا دوا یا م حیض کے مابین پانی سا خون آتا ہو۔ یا خون ملا مواد نکلتا ہو۔ تو فوراً لیڈی

ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

فم رحم اور اندام نہانی سے سفیدی کا آنا

بعض خاوند والی عورت کے رحم اور اندام نہانی سے سفیدی خارج ہوتے ہی خواہ عورت حاملہ ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اس کا رنگ سفید یا قدرے زردی مائل ہوتا ہے۔ شبے روز میں کئی اونس تک خارج ہوتی ہے۔ کبھی یہ سفیدی مثل انڈے کی سفیدی کے ہوتی ہے۔ جس قدر یہ سفیدی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر خون حیض کم ہوتا ہے زیادہ شدید حالت میں خون حیض بالکل موقوف ہو جاتا اور بجائے اُس کے صرف سفیدی نکلتی ہے۔ یہ سفیدی دراصل فم رحم اور اندام نہانی کی معمولی رطوبت ہے جو بوجہ ضعف و نقاہت و خرابی صحت اور قبض شکم کے زائد پیدا ہو کر نکلا کرتی ہے۔

علامات۔ بہو کم ہو جاتی ہے۔ قبض رہتا ہے۔ اکثر دوراں سر۔ اور اختلاج قلب ہوتا ہے۔ کبھی غشی ہوتی ہے۔ باعصبی درد ہونے لگتا ہے۔ نفخ شکم ہو جاتا ہے۔ کمر یا بائیں پہلو میں درد ہوتا ہے۔ چہرہ پیلا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی علامات باؤگولہ نمایاں ہوتی ہیں۔

اسباب (۱) کمی خون۔ (۲) بے قاعدگی حیض۔ (۳) رحم کی مزمن سوزش (۴) رحم کا ٹل جانا (۵) مریضہ کا کثیر الاولاد ہونا (۶) کم چلنا پھرنا (۷) عیش و آرام میں رہنا (۸) اور تمام وہ اسباب جن سے ضعف و نقاہت پیدا ہو۔

علاج۔ اگر فوراً حیض ہو تو اسکو درست کریں۔ اگر رحم کا مرض ہو۔ تو اسکا علاج کریں۔ اگر ضعف و نقاہت کے سبب ہو۔ تو صحت درست کرنے کے واسطے مقوی ادویہ اور زود ہضم غذا کھلا دیں۔ ملینات سے شکم کو صاف رکھیں تا زہ ہو میں چل

پھر گرم پانی کرادیں۔ اگر ضرورت ہو تو تبدیل آب دہوا کرادیں۔ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو صبح کو سرد پانی میں غسل کرادیں۔ یا ریڑھ پر سرد پانی ڈالیں مقام مخصوص کو صبح شام گرم پانی سے دھوئیں۔ اور گرم پانی میں قدرے پٹکری ملا کر پکاری کریں۔ یا ایک تولہ سنہ چار آدہ سیر کھولتے ہوئے پانی میں لکر سرد کر لیں۔ جب سرد ہو جاوے تو اس کی پچکاری کریں۔ بالوں کی توشک پر شروع رات سے ہوا دار مکان میں سولا دیں۔ زیادہ کپڑا نہ اڑھاویں۔ صبح کو سرد پانی میں چند سکند تک یا جتنی دیر میں تنو تک گنتی گنتی جاتی سے بیٹھاویں۔ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ سفیدی آنے سے مریضہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ خیال غلط ہے بلکہ کمزوری کے سبب سے یہ مرض ہوتا ہے نہ کہ اس کے سبب کمزوری ہوتی ہے۔ اخیر ایام حمل میں کمزور عورتوں کو یہ مرقع اکثر ہو جاتا ہے بعض عورت کو خون حیض زیادہ آتا ہے۔ یا عرصہ دراز تک آیا کرتا ہے۔ اس سے مریضہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اولاد بھی نہیں ہوتی۔ پس لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرادیں۔ تو یہ شکایت رفع ہو جاوے گی۔ اور اولاد بھی ہونے لگے گی۔

اگر کسی عورت کے حمل نہ ٹھیرتا ہو۔ اور اسکے ایام بھی اچھی طرح نہ ہوتے ہوں تو لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں علاج سے آرام ہو جائیگا۔

اگر کسی عورت کے ایام باقاعدہ ہوتے ہوں۔ تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ خوں کا رنگ اور قوام اور مقدار اور اوقات حیض سب درست ہیں۔ الا اگر حیض کے اوقات تو درست اور ٹھیک ہوں۔ مگر اسکی مقدار کم ہو یا زیادہ۔ یا اس کا رنگ اور قوام خراب ہو یعنی خوں کا رنگ پیچکا ہو۔ ان صورتوں میں معلوم ہوگا کہ غالباً مریضہ کی صحت خراب ہے اور اسی سبب سے نطفہ قرار نہیں پاتا۔ ایسی حالت میں لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرانا ضرور ہے۔ اسقاط حمل کے علاج میں نفقات کرنے سے بھی حیض میں فتور آ جاتا ہے۔ پس جب تک رحم اور حیض کی درستی نہ کی جاوے اولاد کا ہونا۔

اور مریضہ کی صحت قائم رہنے کی امید کم ہے۔ اگر کسی عورت کے ایام حیض میں خون کی مقدار زیادہ خارج ہوتی ہو۔ یا بار بار خون آتا ہو تو امراض رحم کا احتمال ہوگا۔ خصوصاً جب کہ مریضہ کے کئی بچے ہو چکے ہوں ایسی حالت میں بیڈی ڈاکٹر سے استخار کرتے کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ کہ مرض رحم کا خفیف ہونا یا شدید ہونا معلوم ہو سکے۔ بعض اوقات بوجہ نہونے درد کے عرصہ دراز تک مہلک امراض رحم پوشیدہ رہتے ہیں یہاں تک کے علاج کا وقت گزر جاتا ہے۔ پس جب مقدار خون زیادہ ہو یا عرصہ تک ایام جاری ہیں یا بار بار خون آتا ہو۔ یا ہر دو ایام کے مابین پانی سا۔ یا خون ملا ہوا مواد۔ خواہ بدبودار ہو۔ یا بلایا ہوا اور خواہ درد ہو یا نہ ہو۔ فوراً بیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کرا کر علاج کراویں۔

عرصہ کی یا ہی عورت کے سہبستری کے بعد اندام نہانی سے اگر خون آوے۔ تو رحم میں سرطان ہونے کا احتمال ہوگا۔ ایسی حالت میں فوری علاج سے بہت سی جانیں بچ جاتی ہیں۔

بعض اوقات بعض عورتوں کو مرض احتناق الرحم یعنی باؤ گولہ کا ہو جاتا ہے جس کے تین بڑے سبب ہیں۔ اول کثیر الاولاد ہونا۔ دوم بار بار اسقاطا حل ہونا سوم خون حیض بکثرت خارج ہونا۔ علاوہ ان کے کل وہ اسباب جن سے کمزوری اور لاغری پیدا ہوتی ہی ہونا جیسے امراض گذشتہ کے سبب کمزور ہو جانا وغیرہ۔ یہ اکثر دو قسم کی عورتوں کو ہوتا ہے۔ اول کثیر الاولاد۔ اور دوم لاولد۔ لاولد عورت اکثر اس مرض میں اور دیگر عصبی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

علامات باؤ گولہ۔ درد سر خصوصاً سر کی ایک جانب ابرو کے اوپر چھیدنے کا سادہ ہوتا ہے۔ مریضہ افسردہ خاطر رہتی ہے۔ وہمی ہو جاتی ہے۔ بلا سبب روتی ہے۔ آنسو بہاتی ہے۔ گھر کے ایک کونہ میں تنہا غلگین سی پڑی رہتی ہے۔ اور ایسا

معلوم کرتی ہے کہ گویا ایک گولہ سا کلیجہ سے اٹھ کر خلق تک پہنچتا ہے۔ اور گلا گھٹنے لگتا ہے۔
 بعض اوقات دل و ہرکنے لگتا ہے۔ مریضہ خیال کرتی ہے کہ اُس کو مرضِ قلب ہے۔
 حالانکہ مرضِ قلب نہیں ہوتا۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے۔ بائیں پہلو میں چھوٹی پسلیوں کے مقام
 پر درد ہوتا ہے۔ گاہے پستان میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ اور مریضہ خیال کرتی ہے۔
 کہ اُس کے پستان میں رسولی ہو گئی ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں شکم کھچتا ہوا معلوم ہوتا
 ہے۔ امعاء میں گڑگڑاہٹ کی آواز سموع ہوتی ہے۔ مختلف مقامات جسم میں درد ہوتا
 ہے۔ کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ۔ اکثر اوقات فالج کی سی علامات معلوم ہوتی ہیں۔
 مریضہ شکایت کرتی ہے۔ کہ اُسکے ایک ہاتھ یا ایک پیر کی طاقت بالکل ذایل ہو گئی ہے۔ یہ علامت
 دفعتاً جاتی رہتی ہے۔ اور ادنیٰ صدمہ سے عود کرتی ہے۔ بعض اوقات جسم میں تشنج
 ہونے لگتا ہے اور علامات کراڑی کی نمودار ہوتی ہیں۔ کبھی مریضہ کا جسم ہچکچک کر اٹھ کھڑا
 کے ہو جاتا ہے۔ اور دانستی بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ علامات رفع ہو جاتی ہیں
 اور مریضہ کو بہت سا بیرنگ شفاف پیشاب آتا ہے۔ گاہے نفخ شکم ہوتا ہے۔ اور
 پیٹ میں قراقرس معلوم ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی ہوا پیٹک سے اٹھ کر
 بطور گولہ خلق تک پہنچتی ہے جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے۔ مریضہ اکثر خائف رہتی ہے
 یہ مرض کبھی اصلی ہوتا ہے کبھی مصنوعی۔ اور کبھی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں۔ کواری
 رگیوں میں اکثر مصنوعی ہوتا ہے اور بیاہی میں اصلی۔ کل علامات مذکورہ ایک نمونہ
 میں نہیں پائی جاتیں۔ کسی میں تھوڑی کسی میں بہت اور کسی میں بہت سی علامات
 نہیں ہوتیں۔ یا کبھی ساری علامات ایک ہی میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ مرض علاج پذیر
 ہے علاج سے صحت ہو جاتی ہے۔ مگر بعض امراض جنکی علامات ان سے ملتی جلتی ہیں
 ان امراض سے مغالطہ ہو سکتا ہے۔ پس لیڈی ڈاکٹر کا ملاحظہ کرانے سے رفع شک
 ہو جاتا ہے۔ و علاج بھی بخوبی ہو سکتا ہے۔

امراض یہ مرض اکثر دیکھا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو ایام بھی باقاعدہ نہیں ہوتے کبھی جلد کبھی بدیر۔ کبھی خون زیادہ کبھی کم جس عورت کا حیض باقاعدہ ٹھیک وقت پر اور مناسب مقدار میں آتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے اور امراض رحم سے پاک اور صاف رہتی ہے۔ حیض دراصل رحم کی صحت کی کوئی ہے اگر حیض درست ہے تو رحم بھی درست ہے۔ اور رحم درست ہے تو عورت بھی تندرست ہے اور تندرستی کی حالت میں اولاد ہونا بھی ضروری ہے۔

جس حیض

جب عورت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو خود بخود حیض آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات دریافت طلب ہے کہ آیا حیض کس سبب سے بند ہوا ہے۔ زیادتی عمر سے یا اصل سے یا امراض رحم وغیرہ سے اگر حمل کے سبب بند ہوا ہے تو علامات حمل سے جنکا ذکر آگے آوے گا تشخیص ہو سکتی ہے۔

واضح ہو کہ جب زیادہ عمر کی عورت حاملہ ہوتی ہے تو شکم بڑھنے کے سوا اور طرح ڈوبلی اور لاغر ہو جاتی ہے۔ چہرہ ناک اور ٹھوڑی میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ٹھوڑی نوک نار معلوم ہوتی ہے۔ اور مریضہ کو اپنی حالت پر اطمینان ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص امراض رحم سے اس طرح کرتے ہیں۔ کہ رحم کے مرض میں رحم نیچے کو گرا جاتا ہو معلوم ہوتا ہے۔ سفیدی کثرت سے آتی ہے اور رحم سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہے خصوصاً شبہ حالت میں لیڈی ڈاکٹر گمنانیہ اور علاج ضروری ہے کیونکہ امراض رحم میں دیر ہونے سے علاج کا عمدہ وقت نکل جاتا ہے۔ اور جب بوجہ زیادتی عمر تدریجی طور پر حیض بند ہوتا ہے تو اس کی تشخیص علامات ذیل سے کی جاتی ہے۔

نہ لگتا ہے
ہے۔
کے مقام
ہے۔
م ہوتا
رہو ہوتا
ہیں۔
پر علامت
شخ
مل مکان
تی ہیں
اور
ہے اٹھ کر
ہتی ہے
نکواری
س لہجہ
ت
ج بدیر
نہیں
شک

علامات جس میں بوجہ زیادتی عمر

طرح طرح کے عصبی امراض اور دیگر قسم کی تکالیف میں مریضہ کا مبتلا ہو جانا۔ پستانوں میں درد ہونا رحم سے مواد کا خارج ہونا۔ کولیک اور رحم میں درد ہونا۔ عورت کو رسولی یا سرطان کا گمان ہونا۔ چوبیس یا پینتالیس سال یا گاہے اڑتالیس سال کی عمر کا ہونا۔

حیض بند ہونے سے قبل مریضہ کی حالت میں تغیر آ جاتا ہے۔ یعنی کبھی حیض سے پہلے اور کبھی پیچھے علیل ہو جانا۔ ایسے وقت میں اگر ٹھیک طور سے خبرداری نہ کی جاوے۔

تو مریضہ کی صحت بگڑ جاتی ہے معمولی طور پر عورت کو صرف تین سال تک حیض آیا کرتا ہے کبھی اس سے مزید تین سال تک جب حیض موقوف ہونے لگتا ہے۔

تو کمزور اس میں بے قاعدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور طبیعت ناساز رہنے لگتی ہے۔

خون حیض عادت کے خلاف کبھی کم کبھی زیادہ آنے لگتا ہے۔ اور حیض کے اوقات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ خون کا رنگ ہلکا یا بیرنگ پانی سا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خوب سرخ مثل تازہ خون کے ہوتا ہے۔ اور کبھی سیاہ گاڑا مثل شیرہ کے ہو جاتا ہے۔ گاہے اس قدر زیادہ خون خارج ہوتا ہے کہ گویا اسقاط حمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حیض نہیں آتا۔ گویا یہ آخری حیض تھا۔ بعض قوی عورت کو بلا ظاہر ہونے کسی علامت کے دفعتاً خون بند ہو جاتا ہے۔ خون بند ہونے کے ایام میں اشتہا بڑھ جاتی ہے۔ اور تمام جسم میں خصوصاً سینہ اور شکم میں چربی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنے کہ مریضہ کو حاملہ ہو جانا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ دفعہ حمل کی تیاریاں کرنے لگتی ہے۔

شوری میں اس قدر چربی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دھیری معلوم ہونے لگتی ہے۔ چربی سبب بڑی معلوم نہیں ہوتی مختلف مقامات جسم میں درد ہونے لگتا ہے۔ کبھی

ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی پیشانی پر۔ کبھی آنکھ پر کبھی پشت میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن روشنی اور شوق غل سے درد سر زیادہ نہیں ہوتا طبیعت نازک ہو جاتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے چہرہ اور گردن تھمتائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جس سے مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور عصبی علامات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ مریضہ اپنے آپ کو دیوانہ خیال کرنے لگتی ہے۔ پتا تو نہیں درد اور دم ہو جاتا ہے گا ہے نفع شکم ہو جاتا ہے۔ دن کو غنودگی رہتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی پسینہ آتا ہے ہاتھ پیر سُن ہو جاتے ہیں۔ مریضہ بد مزاج ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب شکم میں درد ہوتا ہے۔ ہوا صر آنتوں کی میں نہیں بلکہ معدہ میں جی رہ جاتی ہے جس سے مریضہ کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اُس کو اپنی زندگی و بال ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہوا چڑھ کر حلق میں پہنچتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے اور علامات باؤ کو لہ کی نمایاں ہوتی ہیں۔ ادنیٰ سبب سے مریضہ ہنستی یا روتی ہے۔ بائیں پہلو میں چوٹی پسلیوں کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے بعض اوقات ادنیٰ سبب سے پیشاب خطا ہو جاتا ہے جیسے پھینکنا کھانا وغیرہ۔ پشت کمر اور زیریں حصہ شکم میں بھی درد ہوتا ہے۔ خونی بوا سیر ہو جاتی ہے یا تکیہ جاری ہو جاتی ہے۔ خصوصاً ایام حیض میں ایسے خون کو روکنا نہ چاہئے۔ جب تک کہ بہت زیادہ نہ ہو جلد پر خصوصاً چہرہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ جو علاج سے رفع ہو جاتے ہیں۔ اور نشان باقی نہیں رہتے۔ اگر معقول طور پر مریضہ کا علاج کیا جاوے تو صحت ہو جاتی ہے بلکہ اگلی حالت سے بھی زیادہ تندرست ہو جاتی ہے۔ اگر چالیس سال کی عمر میں عورت خود بخود دفتا فرہ ہو جاوے اور ایام بھی باقاعدہ ہوتے ہیں تو بھی اولاد ہونے کی توقع کم ہوگی قوی اور چلنے پھرنے والی عورت کو یہ عارضہ کم ہوتا ہے اور بعض اوقات پچاس سال تک کی عمر میں حیض آتا رہتا ہے اور اولاد

ناونہیں

طمان

نا۔

پہلے

ے۔

نیض

ہے۔

سبب

اوقات

اوقات

کے

س کے

کسی

اثر

جتنے

ہیں

جبرانی

کبھی

ہوتی ہے۔ حیض بند ہونے کی حالت میں دن میں ایک بار یا دو بار ہفتہ میں ایک یا دو بار یا کبھی ایام حیض کے معمولی اوقات میں گرمی کے شعلے معلوم ہو کر تمام جسم گرم اور سرخ ہو جاتا ہے بعد اُپسینہ اگر اور سردی لگ کر جسم ٹہنڈا ہو جاتا ہے۔ اور علامات باؤ کو لہ شامل ہو جاتی ہیں۔ مریضہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مگر یہ امر معلوم ہونے سے کہ یہ سب تکلیف عارضی ہیں۔ اطمینان ہو جاتا ہے اور علاج سے آرام ہو جاتا ہے حیض بند ہونے کے زمانہ میں طرح طرح کے عوارض جن کا ذکر اوپر ہوا لاحق ہوا کرتے ہیں۔ پس لازم ہے کہ ایسے اوقات میں علاج غافل نہ ہوں ورنہ خوف ہے کہ مریضہ کی صحت بگڑ جاوے۔ کیونکہ آئندہ زمانہ میں اس کا تندرست رہنا یا زہنا اسی پر منحصر ہے علاج سے نہ صرف وہ علامات جن کا ذکر اوپر ہوا ارفع ہوتی ہیں بلکہ بہت سے سخت امراض سے نجات ملتی ہے۔ اگر یہ زمانہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ تو آئندہ زمانہ میں وہ خوب خوش حال اور تروتازہ زندگی بسر کرتی ہے جس علاج سبب کو دریافت کریں اگر مزمن سوزش رحم ہو یا رحم اپنی جگہ سے ہٹ ہو تو اس کا علاج کریں ورنہ موجودہ علامات کا علاج کریں شکم کو ملیناٹ صاف رکھیں۔

Tincture Genger Citrate of magnesia

اگر مریضہ قوی ہو تو نمکین مہل دیں کمزور ہو تو سائٹریٹ ان میگنیشیا ہر دو چکر خیر کے دیں۔ دوسرے واسطے کلورل میڈریٹ کو کافر کے ساتھ رکڑ کر اس کا شیرہ پینٹا فیکٹیوں پر میں
Chloral Hydrate
بدخواہی کے واسطے یہ نسخہ دیں۔

برومائیڈن پٹاسیم۔ اگر کریں۔ *Bromide of potassium*
پانی ایک اونس ۱۵۰۰
Water

ایسی تین خوراکیں دن میں تین مرتبہ دیں۔

یاس عرق سے جس کا نسخہ ذیل میں لکھا جاتا ہے اسے سفنج یا کپڑا بہگو کر سر پر رکھیں۔

نسخہ

Solution of Ammonia ۲ اونس۔
2oz

Common salt 2oz کہانی کا نمک ۲ اونس۔

Purified spirit 3dr ۲ ڈرام شراب مقطر

Water 32oz ۳۲ اونس پانی

تمنا ہٹ اور اختلاج قلب کے واسطے

Sulphate of Iron ۵ گرن۔
And of Quinine 5grs
Water ۱oz پانی ایک اونس۔

ملا کر دن میں تین مرتبہ پلاویں۔

باؤ گولہ کے واسطے

Purified zinc 2gr ۲ گرن۔
Purified zinc 2gr

Extract Gentiana ۵ گرن۔
Extract Gentiana 5gr

گولی بناویں ایسی ایک ایک گولی دن۔
required for a pill

میں تین مرتبہ دیویں۔
to be taken three times a

day

اگر زیادہ علاج کی ضرورت ہو تو لیڈی ڈاکٹر جمع کریں۔

یک
ترم
اور
علوم
رام
جا
رنہ
ست
رفع
بت
سہ
بہت
سات
ن
بہر
خبر
کا
ن
ی

جو عورت حالت جوانی میں سیدھی سادی زندگی بسر کرتی ہے۔ شراب خواری اور منشی شادی سے پرہیز کرتی گھر کا کام کاج کرتی چلتی پہرتی تھی ہے اُس کی صحت اُن عورات سے جو عیش و عشرت اہل عصب اور ایک جا بیٹھی اور پڑی رہنے میں بسر اوقات کرتی ہیں۔ بدرجہا بہتر ہوتی ہے۔ اور عرصہ دراز تک نو جوان بنی رہتی ہے عیش و عشرت کرنے والیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں۔

ہدایات

جب امور ذیل میں سے کوئی بھی بات پیش آوے تو لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کر لیں
اول۔ حیض کا خون زیادہ مقدار میں آتا ہو۔ یا زیادہ عرصہ تک رہے یا بار بار آوے۔

دوم۔ عرصہ کی بیابھی عورت کے جماعت کے بعد اندام نہانی سے خون آوے۔
سوم۔ اگر پانی کے مانند یا بدبودار رطوبت اندام نہانی سے خارج ہوئے۔

علامات حمل

۱۔ حیض کا بند ہو جانا حمل کی پہلی علامت ہے۔ خصوصاً جبکہ حیض موقوف ہونے سے پہلے عورت تندرست ہو۔ یہ قوی علامت ہے۔ تاہم اور علامات بھی ہونا چاہئے تاکہ حمل کا پورا یقین ہو جاوے۔ اگر خاوند والی تندرست عورت جس کے اولاد ہونے کی عمر بھی ہو اس کا حیض دفعتاً بند ہو جاوے تو حمل کا یقین ہو گا۔ جن عورات کے اولاد ہو چکتی ہے۔ وہ اسے خوب سمجھتی ہیں۔ اور اسی ایک علامت پر قیاس کر کے حساب لگاتی ہیں۔ چونکہ حیض اور سبب سے بھی بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً امراض رحم۔ یا رحم کی بے قاعدگیاں۔ یا اندونی اعضاء کے امراض۔

خصوصاً پیپٹری کے امراض۔ اس واسطے صرف اسی ایک علامت پر پورا بہرہ نہیں ہو سکتا۔ شاید نادرا یا بھی ہوتا ہے۔ کہ حاملہ ہونے کے بعد دو تین ماہ تک کچھ نہ کچھ خون آتا رہتا ہے مگر جب خون باقاعدہ آوے اگرچہ اور علامات بھی پائی جاویں تو حل نہیں ہوتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد ایک حیض بلا اس کے کہ حل ہو نہیں ہوتا۔ اس واسطے دوسرے حیض کا انتظار کریں اگر دوسرا حیض بھی نہ آوے۔ تو حاملہ ہونا یقینی ہے۔

۲۔ متلی۔ یہ بھی حل کی ایک علامت ہے۔ جو اکثر صبح کو ہوتی ہے۔ اور شروع ہی حل لینے پندرہ روز۔ یا تین ہفتہ میں شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی استغفر خیمہ ہو جاتا ہے۔ صبح کو اٹھتے ہی حاملہ کا جی ملتا ہے۔ اور منہ سے تیش پانی آتا ہے اگر بیضہ نے شب کو اچھی طرح کھانا کھایا ہو تو گاہے قے بھی ہو جاتی ہے۔ بعد اس کے دن بھر خوش و خرم رہتی ہے۔ اور کھانا رغبت سے کھاتی ہے۔

بعض اوقات بلا حل معدہ کی خرابی سے بھی جی ملتا اور قے ہوتی ہے۔ اور اگر حل کی حالت میں معدہ بھی خراب ہو۔ اور ہاضمہ درست نہ ہو تو دونوں قسم کی علامات شامل ہو جاتی ہیں۔ پس اب اس امر کا دریافت کرنا ضرور ہے کہ آیا متلی صرف حل کے سبب سے ہے۔ یا معدہ کی خرابی کے سبب سے یا دونوں امور شامل ہیں۔

جب بلا شرکت معدہ صرف حل کے سبب متلی ہوتی ہے۔ تو اکثر صبح کو اٹھتے ہی ہوتی ہے۔ اور تمام دن طبیعت اچھی رہتی ہے۔ اور جب معدہ کی خرابی سے ہو۔ تو تمام دن طبیعت خراب رہتی ہے۔ اشتہا بگڑ جاتی ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے زبان سفید ہو جاتی ہے۔ اور نفخ شکم ہو جاتا ہے اگر حل کی حالت میں معدہ بھی خراب ہو جاوے۔ اور ہاضمہ درست نہ ہو اور دونوں

شی

سے

ہیں۔

کر

کر

بار

ے۔

نے

ت

چ

نے

ت

اس

لا

قسم کی علامات شامل ہو جاویں تو البتہ جی متلانے کی کیفیت دن رات رہے گی۔
 ایسی صورت میں معدہ کی خرابی کو دور کریں۔ تو پھر صرف ایک ہی قسم کی تکلیف یعنی
 حمل کی متلی رہ جائے گی۔ جو بچہ کی حرکت کرنے کے وقت خود بخود جاتی رہے گی
 حاملہ عورت کو اکثر متلی ہوتی ہے۔ (ہمیشہ نہیں) اولاد والیاں اس علامت پر زیادہ اعتبار
 کرتی ہیں۔ جس عورت کو حمل کے سبب ایک بار متلی ہو چکی ہوتی ہے وہ اس کو خوب
 پہچان لیتی ہے۔ کیونکہ یہ خاص قسم کی متلی ہے۔ جو اور اقسام کی متلی کے مشابہ نہیں
 ہوتی۔ یہ متلی تو اکثر شروع میں ہوتی ہے۔ مگر گاہ گاہ اخیر میں بھی ہوتی ہے **علاج**
 اگر صبح کو اٹھنے سے پہلے ایک پیالی تیز کافی کی پلاویں تو افادہ ہو جاتا ہے۔ یا مریضہ
 کو بستر ہی پر کھانا کھلاویں اور بعد کھانے کے گھنٹہ بھر تک اسی جگہ پر رہنے دیں۔
 تو ہی متلی میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے افادہ نہ ہو تو بائی کاربونیٹ

فٹ پٹاس ڈیڑھ ڈرام پاؤسیر بائی میں *Bicarbonate of potash*
 ملا کر اس میں سے نصف چھٹانک کو ایک

لیمو کے عرق میں ملا کر جوش آتا ہوا گھنٹہ گھنٹہ بعد پلاویں۔ اگر معدہ بہاری ہو اور
 قے نہ آتی ہو تو گرم پانی اور نمک ملا کر قے کراویں۔ اور شکم کو ہلکے ملیناٹ سے صاف
 رکھیں۔ اور ہلکی زد و بھغم غذا کھلاویں اور یہ نسخہ دیں۔

کاربونیٹ آف میگنیشیا ۲۔ ڈرام *Carbonate of magnesia 2 drs*

سلفیٹ آف میگنیشیا۔ ایک اونس *Sulphate of magnesia 1 oz*

پے پرسنٹ واٹر ۷۔ اونس۔ *Pepper mint Water 7 oz*

اس میں سے ایک ایک چھٹانک ہر صبح کو پنی لیا کریں۔ اگر مثلی اور قہمت زیادہ ہو
اور تمام دن رہے تو آدہ آدہ گھنٹہ بعد دو دو تین تین بچھے شور یا پلاویں یا سال
وولے ٹائل ۴۰ قطرے Solvolatide 40 drops تھوڑے سے
پانی میں ملا کر پلا دیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک قطرہ اپنی کا کیوانہ
Specucuarha wine

ایک چار کے چھپانی میں ملا کر گھنٹہ گھنٹہ بعد پلاویں۔ برف چوسنے کو دیں۔ معدہ پر رانی
کا پلاسٹر لگا دیں اگر تے اور مثلی کسی طرح موقوف نہ ہو تو کلورال ہائیڈریٹ ہم گرس چا
اولس پانی میں ملا کر

حقنہ کریں۔ Chloral Hydrate 40 gr

حاملہ شروع میں معدہ اور رحم کے ہمدردی تعلق سے متلی ہوتی ہے اور اخیر کو جو
متلی ہوتی ہے وہ رحم کے دباؤ سے جو معدہ پر پڑتا ہے ہوتی ہے۔

تیسری علامت حمل کے دوسرے مہینے سے پستان بڑھنے لگتے ہیں۔ ٹیس اور شتر
چہوٹنے کا سادہ ہوتا ہے۔ اور پٹنیوں میں درد ہونے لگتا ہے شروع حمل سے چند
ماہ بعد دبانے سے قدرے آبی رطوبت یا دودھ نکل آتا ہے۔ پہلو ٹی کے حمل
میں یہ قوی علامت ہے جس سے عام طور پر حمل کا یقین ہو جاتا ہے۔ مگر جن کے
اولاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اُن میں یہ علامت حمل کی قوی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ
دودھ چھوڑنے کے بعد بھی اگرچہ حمل نہ ہو۔ مہینوں تک تھوڑا سا دودھ پستانوں میں
باقی رہ جاتا ہے۔ پستانوں کی رگیں نیلی اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ اُن میں درد
کے سے نشان پڑ جاتے ہیں چہوٹنے سے چھائیاں سخت اور گانٹہ دار معلوم
ہوتی ہیں پٹنیاں ادبھری ہوئی اور بڑی ہوتی ہیں۔ اور اون پر نمی پانی جاتی
ہے۔ حمل کے دوسرے مہینے پٹنیوں کے گرد سیاہ بھورے رنگ کا حلقہ

رہے گی۔
بہت بے
رہے گی
وہ اعتبار
س کو خوب
ماہ نہیں
علاج
یا مریضہ

دیں۔
نیٹ
س

ہواور
صاف

س

س

س

پڑ جاتا ہے جو رفتہ رفتہ حمل کے اختتام تک گہرا سیاہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ قوی علامات نہیں بلکہ حمل بھی ایسا حلقہ ہو سکتا ہے۔

چونکی علامت۔ چونکہ مہینہ کے خاتمہ کے قریب بچہ منکھ میں حرکت کرنے لگتا ہے مگر بعض اوقات تیسرے مہینہ اور کبھی پانچویں اور شاذ و نادر چھٹے مہینے میں حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت کے پیدا ہونے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حمل کا زمانہ قریب نصف کے گزر گیا۔ جن عورتوں کو اسقاط حمل کی عادت ہوتی ہے اس حرکت کے پیدا ہونے کے بعد یہ خطرناک جاتا رہتا ہے۔ اس وقت حاملہ اکثر کمزور پریشان خیال اور نازک مزاج ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات علامات باؤگولہ کی نمایاں ہوتی ہیں شاذ و نادر بعض حاملہ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بچہ کب منکھ ہوا۔ شروع میں بچہ کی حرکت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے بچہ پھرتا رہتا ہے۔ مگر چھ ماہ کے بعد جب بچہ قوی ہو جاتا ہے تو یہ حرکت کو دھکنے کی سی معلوم ہوتی ہے۔ بعض نوجوان حاملہ عورتوں کو نفع شکم ہو جاتا ہے۔ تو بچہ کی حرکت کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ مگر علامات ذیل سے فرق معلوم ہو جاتا ہے۔

نفع شکم	حمل
۱۔ کبھی پیٹ بڑا معلوم ہوتا ہے کبھی چھوٹا۔	۱۔ پیٹ کا پھلاؤ یکساں رہتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔
۲۔ دبانے سے غغراہٹ کی آواز معلوم ہوتی ہے۔	۲۔ دبانے سے رحم کا پھلاؤ بدستور قائم رہتا ہے۔ غغراہٹ کی آواز نہیں آتی۔
۳۔ ٹھوکنے سے صاف آواز مثل ڈبل کے آتی ہے۔	۳۔ ٹھوکنے سے گند آواز نکلتی ہے۔ جیسا کہ میزبانگری کے تحت پر ٹھوکنے سے آتی ہو۔

۴۴۔ انگلیاں گڑانے سے ہو کی حرکت
مخسوس ہوتی ہے۔
۴۵۔ انگلیاں گڑانے سے بیٹ سخت
معلوم ہوتا ہے۔

پانچویں علامت بچے کی حرکت پیدا ہونے کے بعد ہی شکم بڑھ کر گول اور سخت
مثل نمبروز کے ہو جاتا ہے یہ حمل کی بڑی علامت ہے۔ مگر گاہے بہت کم چربی پیدا
ہو کر پیٹ پر مثل غلاف کے چھا جاتی ہے۔ اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حمل کا مخالف ہو جاتا
ہے۔ اس کی تشخیص اس طرح پر کرتے ہیں کہ پیٹ کو ہاتھ سے دبا دیں اگر چربی ہے
تو ملائم مثل گندھے آسٹے کے معلوم ہو گا۔ اگر حمل ہے تو سخت اور گول معلوم ہو گا۔
خصوصاً جب کہ بچہ رحم میں متحرک ہو چکا ہو۔

چھٹی علامت۔ ناف کا پھول جانا بچہ کی حرکت کرنے کے کچھ عرصہ بعد یہ علامت
ظاہر ہوتی ہے۔ شروع حل سے دو ماہ تک ناف اندر کو گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور
جس قدر حل بڑھتا جاتا ہے ناف باہر آتی جاتی ہے۔ اور شکم کی جلد کے برابر ہو جاتی
ہے۔ بعد رفتہ رفتہ باہر اتر پھول جاتی اور مثل گولی کے ہو جاتی ہے۔ اس کے ہمراہ آنت
کا حلقہ بھی چلا آتا ہے جسکو امبلیکل ہرنیا یعنی ناف کا فتق کہتے ہیں۔

ساتویں علامت۔ حل کے شروع مہینوں میں حاملہ لاغر ہو جاتی ہے چہرہ
اور ناک میں جھریاں پڑ جاتی ہیں ناک کی نوک محل آتی ہے حاملہ کی شکل بد ل جاتی ہے
خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ لیکن جس قدر حل بڑھتا جاتا ہے۔ خوبصورتی رفتہ رفتہ خدو کر
آتی ہے۔ یہ لاغری سوائے حل کے اور سبب سے بھی ہوتی ہے۔ مگر جب اس کے
ہمراہ اور علامات حل پائی جاویں تو شک نہیں رہتا۔ یہ علامت اکثر نہیں بچتی
آکھوین علامت۔ بار بار پیشاب کا آنا شروع حل میں پیشاب بار بار آتا ہے

علامت

بے لگت

رکت

کا زمانہ

اس

شروع

نولہ کی

خبر

ہے۔

م ہوتی

امثالہ

بلکہ رفتہ

قائم رہتا

ہے۔

جیسا کہ

ہو۔

اور پچیلے ایام حمل یعنی وضع حمل کے قریب بھی ایسا ہونے لگتا ہے شروع میں جب ایسا ہوتا ہے تو مریضہ کو سخت تکلیف اور درد ہوتا ہے نیند نہیں آتی۔ رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور صرف چند قطرے پیشاب کے آتے ہیں۔ یہ کیفیت بچہ کی حرکت کرنے کے بعد جاتی رہتی ہے۔ اور جب وضع حمل کے قریب پیشاب بار بار آتا ہے تو اس میں درد نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کو حالت حمل میں پیشاب کی حاجت کم ہوتی ہے۔ اور بعض کو جلد جلد اور بعض حاملہ ایسی ہوتی ہیں کہ پیشاب کو بہت کم یا بالکل روک نہیں سکتیں۔ اور فی سبب یسے چلنے پہرنے جھکنے کہانس نے پھینکنے سے پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور بعض کا پیشاب بیٹھے بیٹھے نکل جاتا ہے۔

جن عورتوں کو پیشاب کی حاجت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی ان کو چاہئے کہ چلیں پھریں۔ اور چار چار گھنٹہ بعد خواہ حاجت ہو یا نہ ہو پیشاب کرنے کی کوشش کریں جن کو بار بار پیشاب آتا ہو ان کو یہ نسخہ دیں۔

نسخہ

صمغ عربی (گوند بول) ۱ تولہ۔

جو کی گری۔ ۲ تولہ۔

ان کو ایک سیر پانی میں پندرہ منٹ تک جوش دیکر چھان لیں اور اسقدر مصری ملا دیں کہ خوش ذائقہ شیریں ہو جاوے اس میں سے تھوڑا تھوڑا دن میں کئی مرتبہ پلاویں۔ یا کسی کا جوش اندہ۔ یا دودھ میں چونہ کا پانی ملا کر پلاویں ہلکے ملیخات سے پیٹ کو صاف رکھیں۔ بلکی زود بضم غمدا کھلا دیں یا ساٹھ

قطرے سویٹ اسپرٹ آف نیٹر
کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر سوتے وقت پلاویں
Sweet spirit of nitre

پلاویں جو عورتیں پشیاں کو بالکل روک نہیں سکتیں ان کو چاہئے ایک پیٹی یا چوڑا
مکربند شکم کے زیریں حصہ پر باندھ لیویں تاکہ شکم کو سہارا رہے اور مثانہ پر کم دباؤ پڑے
مریضہ دن کو اکثر لیٹی رہے پانی یا اور کوئی سیال چیز کم پیوے وضع حمل کے بعد
یہ شکایت خود بخود رفع ہو جاوے گی۔

نویں علامت بچہ کے دل کی حرکت۔ پانچوے جینے پچہ کے دل کی
حرکت کی آواز محسوس ہوتی ہے یہ آواز گھڑی کی آواز سے جبکہ وہ تکیہ کے نیچے رکھی ہو مثلاً ہوتی
ہے۔ اور کونہ کی ٹھڈی اور ناف کے درمیان داہنی طرف یا بائیں طرف محسوس ہوتی ہے۔
غشی۔ تاکہ مزاج کمزور حاملہ عورت کو کبھی غشی ہو جاتی ہے۔ ظاہر یہ خطرناک علامت ہے۔
مگر حقیقت خطرناک نہیں البتہ اگر مریضہ امراض قلب میں مبتلا ہو تو خطرناک ہے۔ یہ غشی
اکثر بچہ کے حرکت کرنے کے وقت یا کبھی چوتھے جینے کے شروع میں ہو جاتی ہے۔

علاق مریضہ کو فوراً جیت لٹا دیں سر کے نیچے تکیہ نہ رکھیں۔ تاکہ جسم کے برابر رہے
تمام بند جو کسے ہوں اور جسم کے کپڑے ڈھیلے کر دیں چہرہ سر اور چھاتی پر سرد پانی کے
چھینٹے ماریں مکر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں بہت سے آمبیوں کو جمع
نہ ہونے دیں۔ ہاتھ پیروں کو ملیں سال و ولے ٹائل بم قطرے تھوڑے سے
پانی میں ملا کر پلا دیں۔

کاربونیٹ آف امونیا *Carbonate of Ammonia* یا چونہ اور نو سادر
ملا کر سونگھاویں۔ یا پرچلا کر ناک کے سامنے لگاویں۔ اس تدبیر سے۔ انتشار اللہ غشی
جاتی رہے گی۔ ہلکی اور زود ہضم غذا کھلاویں۔ ہوادار کرہ میں سولادیں اور یہ نسخہ
پلاویں۔

کوئین ۱۱ گرین - 12 grs Quinine
ڈیلیوٹ سلفورک اسڈ ۳۰ قطرے - 30 Dilute sulphuric acid

بیب
باراٹھا
نے کے
س میں
ہے۔
ل نہیں
ا ہو جانا
لہ چلیں
ا کریں

قدر
دن
پلاویں
ساٹھ
ا

شربت نازنگی ۲ تولہ Syrup of orange 1 oz

Water

پانی ۴ چھٹانک
For 8 days one to be taken three times a day

سب کو ملا کر آٹھ خوراکیں کریں ایک ایک خوراک دن میں تین مرتبہ پلاویں۔ اگر ممکن ہو تیدیل آب و ہوا کرا دیں۔

اختلاج قلب۔ نازک مزاج حاملہ عورتوں کو اکثر اختلاج بھی ہو جاتا ہے۔ جل میں اختلاج قلب ہونا خطرناک نہیں شب کو سوتے وقت ہو تو البتہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے واسطے یہ نسخہ پلاویں۔

Compound Tincture of Lavander 1 dr

ایرومٹک اسپرٹ ان ایونیا ۱۱ ڈرام۔ ۱۱ دن

اس میں سے ایک ایک ڈرام یعنی ۴ ماشہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پلاویں۔ اس دوا کو تیار کر کے پلنگ کے قریب رکھ دیں تاکہ وقت ضرورت دیر نہ ہو۔ دلی جوش اور لگان سے بچاویں۔ دن چڑھے تک سونے نہ دیں کھلے مکان میں رکھیں۔ تفسیح اور جیل قدمی کرا دیں طبیعت کو خوش رکھیں۔

تشنج۔ حمل کے پچھلے دنوں میں بعض اوقات لٹون اور پٹلیوں میں (حمل کا دباؤ اعصاب پر پڑنے سے) تشنج ہونے لگتا ہے۔ پٹلیوں اور رانوں کو تشنج کے مقام سے کچھ اُپر تک مضبوط کپڑے سے خوب کسکر چیمٹ کے واسطے باندھ دیں ہاتھ سے مالش کرنا بھی مفید ہے۔ گاہ گاہ یہ تشنج امعاء اور پیٹھ میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بوتل میں گرم پانی بھر کر بائیٹ یا پتھر کو گرم کر کے فلائین وغیرہ میں لپیٹ کر مقام درد کو سیکیں یا ربرکلی بوتل میں گرم پانی بھر کر سیکیں اور پیروں کے تلوں کو بھی سیکیں۔

Rs

اگر اس سے آرام نہ ہو تو یہ نسخہ دیں۔

Compound Tincture of camphor 1 oz

کیمپوڈٹنکچر ان کیمفر ایک اونس

دل واٹر (سوئے کا پانی) ۵ اونس 5oz Dil water
اس میں سے ایک چھٹانک سوتے وقت پلا دیں۔ 2oz at bed time
اگر ضرورت ہو تو چار گھنٹے بعد پھر پلا دیں۔

خراش اور خارش۔ کبھی حاملہ کے اندام نہانی کے بیرونی حصوں میں خراش اور
خارش ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ مرض ہے حل کی حالت میں بروقت ہو سکتا ہے مگر خصوصاً
اخیر ایام حمل میں زیادہ ہوتا ہے خراش کے سبب شب کو نیند نہیں آتی اور صحت خراب
ہو جاتی ہے۔ اگر عرصہ تک یہ مرض رہے تو وہ مقام سخت ہو جاتا ہے۔

اسباب اس میں سوئی کرم کا ہو جانا جو مین پڑ جانا مثلاً میں خراش ہو جانا۔
اندام نہانی سے سفیدی کا خارج ہونا چہا جن کا ہو جانا مرض نفرس یا زیا بطس کا ہونا رحم میں
سرطان کا ہونا شکم کی جلد یہ اعصاب میں نقص واقع ہونا بعض اوقات خراش کی جگہ باریک
باریک دانے جن میں پانی سا مواد بہا ہوتا ہے شامل ہو جاتے ہیں۔

علاج سبب کو دور کریں خراش کم کرنے واسطے برف کے پانی یا سرخ پانی سے دھویں۔
اگر باریک باریک دانے بھی ہوں تو پانی میں قدرے پشکری ملا کر دھویں۔ یا پوست کا جوشانہ
ٹھنڈا کر کے دھویں معدہ اور امعاء کو ملینات سے صاف رکھیں۔ ہلکی اور زود ہضم غذا کھاویں
اگر اس سے آرام نہ ہو تو گرم پانی سے سینک کریں یا یہ عرق جو ذیل میں لکھا جاتا ہے۔
لگا دیں۔

Solution of acetate of - سلوشن آف اسیٹک لفٹ ایکڈرام۔
Rectified spirit 1 dr شہاب مقطر ایک ڈرام
Water 1 pint پانی دس چھٹانک 1 pint

اس عرق سے دن میں تین یا چار مرتبہ دھویں۔ یا مساوی مقدار سرکہ اور پانی ملا کر
دھویں۔ یا تھوڑے سے پانی میں اس قدر پورے سک ایکڈ۔

حل کریں کہ جتنا ہو سکے لگاویں یا ایک حصہ کاربو ایک اسٹچائش یا ساٹھ حصہ پانی میں ملا کر دھوئیں۔

علاوہ خراش اور کھجی کے اندام نہانی کے اندر اور باہر سوزش اور جلن اور چھوٹے چھوٹے دانے یا پھوڑیاں بھڑکتی ہیں اور سفید مواد جیسا کہ بچہ کے منہ آجانے میں ہوتا ہے۔ مکتا ہے ایسی حالت میں نسخہ ذیل بہت مفید ہے۔

بائی کاربونیٹ آف سوڈا ایک اونس گلی سیریں ۵ اونس
گلی سیریں پانچ اونس۔ سلوشن آف سب اسی ٹینٹ آف لڈ ایک ڈرام
صاف پانی دس اونس یا شراب مقطر ایک ڈرام

عرق گلاب ۵ چٹاک
ان دونوں عرقوں میں سے کسی کو چار چار گھنٹے بعد لگاویں۔

Bicarbonate of soda 1 oz

Glycerine 5 oz

Water Or 10 oz

Glycerine 5 oz

Solution of sub acetate of lead 1 dr
Rectified spirit 1 lb

Rose water 10 drs
غودگی۔ حاملہ عورت اکثر خواب آلودہ رہتی ہے وقت بے وقت جب چاہے سو جاتی ہے۔

سینہ کا جلنا۔ بعض حاملہ عورت کا سینہ جلتا ہے یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے مگر اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا اور علاج سے آرام ہو جاتا ہے۔ چونکہ حاملہ خیال کرتی ہے کہ اب بچہ ہو جائیگا اور دونوں کی پرورش کے واسطے زیادہ غذا

چاہئے اس واسطے زیادہ کھاجاتی ہے اور زیادہ کھانا معدہ ہضم نہیں کر سکتا اور تشری زیادہ ہو جاتی ہے جس سے چھاتی جلنے لگتی ہے۔

علاج۔ غذا کی طرف توجہ کریں، غذائے ہضم نہیں کریں، بلکہ ملائم اور زود ہضم غذا کھلائیں سوڈا اور پیرمنٹ پاخالی سوڈا پانی میں ملا کر پلاویں۔ اگر اس سے آرام نہ ہو تو نسخہ ذیل دیویں۔

Carbonate of ammonia [℞] کاربونیٹ آف ایمونیا پا ڈرام
 $\frac{1}{2}$ dr

Bicarbonate of soda [℞] بائی کاربونیٹ آف سوڈا پا ڈرام
 $\frac{1}{2}$ drs

پانی ۸۔ اونس ۸ oz Water

اس میں سے نصف چھٹانک دن میں دو یا تین مرتبہ پلاویں اگر قبض ہو تو ہیوی کیلسی ایڈف سیکنیشیا۔ ماشہ ایک گلاس پانی میں ملا کر پلاویں۔

Heavy calide of magnesia

منہ سے پانی آنا حاملہ عورتوں کو اکثر اوقات ڈکاروں کے ساتھ منہ میں پانی بہر آتا ہے۔ سینہ جلنے کے ہمراہ کبھی یہ مرض بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ شکم میں متحرک ہوتا ہے تو یہ شکایت خود بخود جاتی رہتی ہے۔ مگر گاہ گاہ ایام وضع حمل تک خصوصاً ان عورتوں میں جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے قائم رہتی ہے۔

علاج۔ پھٹکری کے پانی سے غزارہ کراویں یا پھٹکری کی ڈلی کبھی کبھی منہ میں رکھیں۔ بہتر علاج یہ ہے کہ چار کولیکٹ [℞] جو انگریزی

حصہ پانی میں

ٹپے چوٹے

ہے۔ نکلتے

تا انڈیکٹر

ام

℞

۶

۳۵

خیال

غذا

دوکانوں میں فروخت ہوتے ہیں جب ڈکار کے ساتھ منہ میں پانی آوے تو ایک
بسکٹ کھلاویں یا وہ نسخہ جو سینہ کی چلنے کے علاج میں لکھا گیا ہے دیویں اور اس
کے ساتھ بسکٹ بھی دیتے رہیں۔

پہچیتی۔ اکثر حاملہ کے پیروں اور ٹانگوں میں خاص کرات کو درد ہوتا ہے جس
سے مریضہ نہ تو سو سکتی ہے اور نہ خاموش بڑی رہ سکتی ہے بار بار درد کی شدت
سے سہماری اور پچھاڑیں کھاتی ہے یہ مرض خطرناک نہیں ہے بلکہ خفیف ہے
تاہم بڑا تکلیف دہ ہے مریضہ صبح کو مغموم اور افسردہ خاطر اٹھتی ہے اور دن بھر اس
رہتی ہے یہ مرض عصبی خراش سے پیدا ہوتا ہے اور ایک خاص معین وقت پر سنا
ہے۔ کام نہ کرنے اور کابل بیٹھے رہنے سے ہو جاتا ہے۔

علاج صاف ہوا دار کمرہ میں سولاویں دروازہ اور کھڑکیاں کھولیں پانی
پر زیادہ بچھونا نہ ہو رات کو منہ ہاتھ بازو گردن سینہ کو گرم پانی سے دھو ڈالائیں
ہو اس میں پھل قدمی کرائیں ملائم ہلکی غذا ملائم کھڑی سا گودانہ ارا روٹ وغیرہ کھلاویں
گوشت سے پرہیز کرائیں چار پلاویں اور یہ نسخہ دیں۔

Compound Tincture of Lavander &
Aromatic spirit of Ammonia 1150rs

کپوٹڈ ٹینکچر ان یونڈر ایک ڈرام
ایرومٹک اسپرٹ ان ایمونیا ۱۱۔ ڈرام
اس میں سے ایک چمچ چاکھٹوڑے پانی میں ملا کر سوقت پلا دیں اگر ضرورت ہو تو چار
گھنٹہ بعد پھر پلا دیں۔

تھوک زیادہ آنا۔ حاملہ کو گاہے تھوک زیادہ آیا کرتا ہے بعض اوقات اس شدت
سے آتا ہے کہ گویا منہ آگیا ہے۔ یہ حالت چند روز یا کبھی ہفتوں تک رہتی ہے مگر خطرناک

نہیں۔

اشتہا کا موقوف ہو جانا ایام حمل خصوصاً شروع حمل میں اشتہا جاتی رہتی ہے۔ غذا سے نفرت ہو جاتی ہے کھانے کا وقت آنے سے مریضہ گہلرتی ہے بخلاف اس کے بعض زیادہ رغبت سے کھاتی ہیں۔

رغبت بعض اوقات حاملہ عورت ایسی چیزوں سے رغبت کرتی ہے جو کھانے کے قابل نہیں جیسے خام گاجر خام شلغم کوری ٹھیکری ملتانی مٹی سوندھی مٹی وغیرہ پس اگر وہ چیز نقصان دہ نہ ہو تو مضائقہ نہیں ورنہ نہ دیں۔

بد مزاجی۔ نازک مزاج کمزور حاملہ عورت اکثر بد مزاج ہو جاتی ہے یہ ضعف و نقابت کی علامت ہے اس صورت میں مقوی زود ہضم غذا اچھی طرح دیا جائے۔

بعض کھانے سے رغبت اور بعض سے نفرت شروع ایام حمل میں خصوصاً جبکہ مریضہ کا ہاضمہ کمزور ہو تو وہ بعض چیز کو پسند اور بعض کو ناپسند کرتی ہے ایسی عورتوں کو ہاضمہ کی شکایت رہتی ہے مگر تھوڑے علاج سے یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اور ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔

بعض اوقات حاملہ کے چہرہ اور گردن پر دانے نکل آتے ہیں۔ مگر آسانی سے جاتے رہتے ہیں۔

معدہ اور امعاء میں ہوا کا بہرہ جانا اسکے دو سبب ہیں۔ اول دن کو کم چلنا پھرنا دوم رات کو اچھا اور زیادہ کھانا کھانا اس حالت میں دوا کی ضرورت نہیں صرف سبب کا رفع کرنا کافی علاج ہے۔

بواسیر۔ حاملہ عورتوں کو اکثر بواسیر ہو جاتی ہے بواسیر کے سے چھوٹے چھوٹے ملائم سفیدی سرخ سیاہی مائل بوبیہ یا کو کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور کبھی بیکے برابر یہ تے رگوں کے پھول جانے سے پیدا ہوتے ہیں کبھی مقعد کے اندر

تو ایک
ویں اور اس

ہوتا ہے جس
در کی شدت
عیف ہے
ردن بہرہ
وقت پرستانا

میں پلنگ
ھوڈا لاکریں
غیرہ کھلاویں

Com
Ar

یت ہو تو چار

اس شدت
ہے مگر خطرنا

اور کبھی اس کے گرد ہوتے ہیں۔ اس واسطے ان کو اندرونی اور بیرونی سے کہتے ہیں اور جب ان میں سے خون رستا ہے تو خونی اور نہیں رستا ہے تو باوی کھلاتے ہے ہر اجابت کے وقت اسے خون نکلتا ہے اگر مٹے بڑے ہوں تو اجابت کے وقت نیچے اتر آتے ہیں اور ان کے ہمراہ کچھ حصہ آنت کا بھی چلا آتا ہے جس سے مریضہ کو اور بھی تکلیف ہو جاتی ہے جب ایسا ہو تو مریضہ کو چاہیے کہ اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ با احتیاط تمام اندر کرے مستوں میں درد بہت ہوتا ہے اور باوجود معقول علاج کے بھی تمام ایام حل قائم رہتے ہیں جب رحم کا دباؤ مقعد کی رگوں پر پڑتا ہے تو یہ مٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر مریضہ کو قبض نہ ہو تو یہ مرض نہیں ہونے پاتا اگر مریضہ سخت مہل یوے یا احتفل اور ایلوے کی گویاں کھاوے یا مرض اسہال ہو جاوے تو یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علاج۔ اگر مستوں درد اور سوزش ہو تو پوست کے ڈوڈا اور نابودہ کو پانی میں جوش دے کر اور چھان کر۔ اسٹیفیا فلایین کے ٹکڑے سے دن میں تین بار آدھے آدھے گھنٹہ تک خوب سینک کریں اور شب کو گرم گرم پولٹس باندھ دیں اور ہر اجابت کے پہلے اور پیچھے ہیزیلین *Baseline* کا مرہم یا یہ مرہم جس کا نسخہ ذیل میں لکھا جاتا ہے مستوں اور مقعد پر لگائیں۔

نسخہ

سفوف کافور (جو اسپرٹ کے چند قطرے ڈالنے سے بن جاتا ہے) ایک ڈرام دہویا ہوا گھی ایک چھٹانک ملا کر لگائیں۔ اگر درد اور خراش زیادہ ہو تو ۱۵ پندرہ منٹ تک گرم پانی کا ہپارہ دیں اور پھر گرم گرم پولٹس باندھ دیں اسی طرح دن میں پانچ چھ مرتبہ کریں اگر درد اور جلن بہت زیادہ ہو تو نسخہ ذیل سے بہت

فائدہ ہوتا ہے۔

کافور کاسفوف (ہنزلیہ اسپرٹ بنا کر) ۱/۲ ڈرام
سفوف ماجو بھیل ایک ڈرام
دھویا ہوا آگنی ۳ - ڈرام

ملا کر لگاویں اور اس سے بھی درمیں کمی نہ ہوتو انہوں کا سفوف ۲ ہاگریں اور ملائیں
یا کمپونڈ گال اینٹنٹ لگاویں۔ Compound Gall ointment
یا مساوی مقدار میں گلی سر میں اور ہر انڈی ملائیں۔ پودن میں کمی بار لگاویں
اور ایک یا دو ڈرام معجون سنا ہر صبح کو کھلاویں تاکہ قہقہ نہ ہونے پاوے یا نسخہ
ذیل کا استعمال کریں۔

Rs

صاف کی ہوئی گندہک ۱/۲ اونس *Milks sulphur 1/2 oz*
سفوف سونڈ ۱/۲ ڈرام *Gingerin powder 1/2 dr*
کریم ان ٹارٹر ۱/۲ اونس *Cream of Tartar 1/2 oz*
معجون سنا ایک اونس *Confection senna 1 oz*
Simple syrup 90 One drachm every morning
سادہ شربت حسب ضرورت ملا کر اس میں سے ایک ایک ڈرام ہر صبح کو کھلاویں

دوسرا نسخہ

کاربونیٹ ان میگنیشیا ۲ ڈرام *Carbonate of magnesia 2 drams*
صاف کی ہوئی گندہک ۲ ڈرام *Milks sulphur Each 2 drams*
ملا کر چھ پٹیاں بناویں ان میں سے ایک ایک پٹیا ہر صبح کو یا دوسری صبح کو کھلاویں۔
in six powders one powder every on evening - other morning with water
تیسرا نسخہ۔ انجیر شق سنا ان تینوں چیزوں کو ہم وزن کوٹ کھلائیے ویں۔

سے
نوباوی
تواجبت
ہے جس
کلیوں
برباوجود
رگوں
نے پاما
اسہال
میخوش
ادھے
در ہر صبح
کا نسخہ

ڈرام
سہ
طرح
بہت

نیا

اور جائفل کی برابر یا اس سے قدرے زائد صبح باہر دوسری جھکو دودھ کے ساتھ کھلا دیں اگر
 ادویہ مذکورہ بالا سے پوری کامیابی نہ ہو تو ہفتہ میں ایک بار یا دو بار انڈی کا تیل جیسا کہ
 اوپر ذکر ہوا پلا دیا کریں۔ اگر متوں میں زیادہ سوزش ورم اور درد ہو اور قبض بھی ہو
 تو ہر صبح کو نصف یا ڈھائی پاؤ گرم پانی کا حقہ کر دیا کریں۔ چونکہ ایسی مریضہ
 معمولی بچھونے پر نہیں بیٹھ سکتی اس واسطے رُبڑ کا گدا جس میں نصف ہو یا نصف
 پانی بہا ہو بیٹھا دیں غذا ملائم اور زود ہضم دیں گوشت وغیرہ سے پرہیز کرا دیں۔
 حل میں بوا سیر کا ہونا ایک تکلیف دہ مرض ہے اور کیسا ہی معقول علاج کیا جاوے
 اکثر وضع حل تک قائم رہتا ہے تاہم علاج مذکورہ بالا سے گو کامل صحت نہ ہو بہت
 تخفیف رہتی ہے ہینری لین *Henrienne* کی بتی مقعد میں رکھنے
 سے بہت آرام رہتا ہے درد نہیں ہوتا خون بھی بند رہتا ہے

بیض اوقات حاملہ کے پیروں کی رگیں پھول جاتی ہیں پیروں میں ورم آجاتا ہے
 چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جن عورتوں کی زیادہ اولاد ہو چکی ہوتی ہے
 اُن کو میرض ستاتا ہے یا اُن عورتوں کو جن کی شادی بڑی عمر میں ہوئی ہو یا
 جن کا حل بہاری ہو اور بچے کو جبکا آتا ہو اُن کو بھی یہ مرض ستاتا ہے۔
 علاج لچکدار جڑاں جو بالکل ٹھیک آویں یا نیچے نشینی اور اوپر لچکدار جڑاں میں
 پنہاویں اگر پیر ٹنڈے ہوں تو رات کے وقت آٹھ گز لمبی اور دو ڈھائی انچ چوڑی
 پٹی پیر کے انگوٹھے سے لیکر اوپر تک اچھی طرح باندھ دیں۔

پہلوٹھی کے حل میں اکثر شکم کی کھال کچ جاتی ہے جس سے حاملہ کو تکلیف ہوتی ہے
 علاج تیل اور کا فور ملا کر گرم کر کے صبح و شام مالش کریں اور رات کو فلاس *Flax*
 سی نہ کسی ہو اور نہ ڈھیلی باندھ دیں اور دن کو پٹی باندھ دیا کریں اگر جلد زیادہ
 لچکریٹ جاوے اور وراثیں پڑ جاویں تو لینولین *Linoleum*

کو ملائم کپڑے یا لٹ *Lint* پر لگا کر مقام ماؤں پر لگاویں اور شکم پر چڑی
پٹی جیسا کہ بعد وضع حمل باندھی جاتی ہے باندھ دیں۔

بعض عورات جو زیادہ موٹی ہوتی ہیں اور جن کے زیادہ اولاد ہو چکی ہوتی ہے
اور بعد وضع حمل تھوڑے عرصہ بعد حاملہ ہو جاتی ہیں ان کے پیٹ حمل کی حالت
میں زیادہ بڑھ کر نیچے لٹک آتے ہیں جس سے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔
اس کے واسطے چمکدار پٹی جس سے پیٹ کو سہارا رہے باندھ دیں اگر مریض کمزور
ہو تو علاوہ پٹی کے فلائین کی چوڑی پٹی اتنی بڑی کہ پیٹ پر ڈھلپٹ آ جاویں ایسے طور
شکم پر باندھ دیں کہ نہ بہت کسی ہونہ ڈھیلی

حاملہ عورتوں کے اکثر دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دانت میں گرہا ہو گیا
ہو اور دروبھی ہو تو لونگ کے تیل میں ذرا سی روئی بھگو کر گڑھے میں رکھ دیں یا
لونگ کا تیل اور کلوروفارم مساوی مقدار میں ملا کر دروبھی میں لگا کر رکھیں۔ یا ساوی
مقدار میں انیوں اور کافور ملا کر دانت کے گڑھے میں رکھیں یا ذرا سا تیز ہلاس یا سیاہ مرچ کا سفوف بچھو

اس سے بھی درد جاتا رہتا ہے کریازوٹ *Cresote* کلوروفارم

Chloroform لاؤٹم *Sandalum* پے پرنٹ ایل

Peppermint oil ابل کچا پوتی *Eucalyptus* oil وغیرہ

سے بھی آرام ہو جاتا ہے یا دس گرین پھٹگری کو نصف اونس کلوروفارم میں ملا کر
اور اس میں روئی بھگو کر اس طرف کے کان کے اندر رکھ دیں۔ جب تک درد

رہے ایسا ہی کرتے رہیں پوست کے ٹوٹے اور بیونہ کو پانی میں جوش دیکر میٹھے کو

سنیکین یا تھوڑی روٹی کے گودہ کو گرم درودہ میں بھگو کر گال اور مسوڑوں کے درمیان

بار بار رکھیں اور سوتے وقت گرم گرم روئی رخا چھ باندھ دیں۔ اگر مذکورہ بالا علاج سے

آرام نہ ہو تو جینی کی برابر موٹے کاغذ کا ٹکڑا برائڈی شراب میں بھگو کر اور سیاہ مرچ کا سفوف

بھلا دیں اگر
ل جیسا کہ
ن بھی ہو
مریض
یا نصف
ادیں
باو
بہت
رکھنے

آ جاتا ہے
جوتی ہے
نی ہو یا

بڑا میں
ن پتہ چوڑی

ن ہوتی ہے
لایں پٹی
جلد زیادہ
Sam

چترک کرکال پر لگادیں اور کئی گھنٹے تک لگا رہنے دیں اگر ضرورت ہو تو کئی مرتبہ لگادیں۔
 رانی کا پلاسٹم بھی مفید ہے یا ساوی مقدار سفوف سوٹھ اور میدہ ملا کر اور پانی میں تر
 کر کے مثل لئی کے بنا کر کاغذ پر بچھا کر رخسار پر لگادیں اور تا وقتیکہ درد موقوف نہ ہو
 لگا رہنے دیں اگر دانت اچھے ہوں اور چہرہ میں بھی درد ہو تو نسخہ ذیل دیوں۔

کونین ۲۴ گرین 24 gr quinine

سفوف ٹیٹی ۶ گرین 6 gr Legumice powder

شیر یا شکر سفید اسقدر کہ گولی بن سکے Treacle q.s

اس کی بارہ گولیاں بناویں ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ کھلا دیں۔

Divide into 12 pills one pill 3 times a day

حاملہ عورتوں کا ضروری علاج

چونکہ حاملہ عورت کو اکثر خفیف امراض کی شکایات رہتی ہیں اور ہر چھوٹی بھوٹی بات کے
 واسطے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا یا اسکو بلا نا مناسب نہیں معلوم ہوتا اس واسطے
 چند ضروری ادویہ اور تدابیر بتلائی جاتی ہیں تاکہ مریضہ خود اپنا علاج کر سکے۔

چونکہ حاملہ عورتوں کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے اس واسطے چاہئے کہ وہ کوئی تیز
 سہل نہ لیں کیوں اور مرکبات پارہ ہرگز نہ کھاویں اس مریضہ کو ضرور ہو جاتی ہے اور گاہ گاہ
 اسقاط بھی ہو جاتا ہے صرف ہلکے ملینیات سے شکم کو صاف کر دیا کریں جیسے ارنڈی
 کاتیل شربت انجیر خساندہ سنار و عن سلاڈیو یا منڈیجینی کی مرکب گولیاں شہد انجیر
 انگور ٹہل بہلائے ہوئے سیب ٹہل پھلانی ہوئی ناشپاتیاں تمر ہند کافی وغیرہ
 دلائی ارنڈی کاتیل عمدہ سہل ہے کم مقدار چھ ماشے سے ایک یا سوا تولہ تک گرم
 دودھ یا گرم کافی اور خام شکر میں ملا کر پلا دیں ہفتہ میں دو مرتبہ پلانا کافی ہے اس
 سے قبض رفع ہو جاتا ہے یا گرم کافی میں یا گرم پانی میں چھ ماشہ شہد ملا کر پلا دیں سے

بھی قبض جاتا رہتا ہے صابوں اور گرم پانی کا حقہ کرنے سے بھی قبض نہیں رہتا
 اگر روغن سلاؤدینا منظور ہو تو اس کو بھی ازندی کے تیل کی مقدار کے برابر پلاؤ
 ایک یا دو انجیر یا چند دانے آلو بخارے یا الوچے کے کھلاویں۔ شربت الی بھی مفید
 ہے روغن سلاؤدینا ازندی کے تیل سے زیادہ ملائم سہل ہے اس میں غذایت افزہ
 کرنے کی بھی خاصیت ہے ایک یا دو ریوند چینی کی مرکب گولیاں شیکو کہا لینا یا صبح
 کو ایک سڈلز پوڈر *Seedling powder* (انگریزی نیکن ٹیبل) صبح کو
 پی لینا کافی ہے یا پینچ گولیوں کا مفید ہے۔ *Custile soap 100gr*
oil of curaway 4 drops to make pills کیسٹل سوپ سو کریں
 2-3 on 4 pills to be taken
 occasionally at bed time کارادے ایل چھ قطرے
 سب کو ملا کر ۲۴ گولیاں بناویں ان میں سے دو تین یا چار گولیاں کبھی کبھی سوتے وقت
 کھلا دیا کریں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو سنبھالے رکھے قبض نہونے
 دے طبیعت کو خوش اور بشاش رکھے۔ اقسام تغکرات اور دلی خیالات سے بچے۔
 کھانے پینے خیال رکھے اقسام پھل اور ترکاریاں قبض کے واسطے مفید ہیں صبح کو گرم
 پانی کا ایک گلاس پی لینا اور تازہ ہوا میں خانگی کاروبار کرنا چلنا پھرنا اور معمولی وقت
 پر اجابت کو جانے سے قبض نہیں ہوتا۔

اسہال

قبض کے خلاف کبھی حاملہ کو دست بھی آنے لگتے ہیں پس اگر معلوم ہو کہ امعار
 میں کوئی غیر چیز ہے یا سدا ہے تو تھوڑا ازندی کا تیل پلاویں یا روبرب اور مگیشیا
 کا ہلکا سا مسہل دیں یا ٹینکچر روبرب نصف اونس تھوڑے سے پانی میں ملا کر
 پلا دیں یا یہ نسخہ بہت مفید ہے۔

ہلکائیوں۔

تی میں تر

ت نہ ہو

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

بات کے

واسطے

۔

۔

کوئی تیز

ورگاہ گاہ

۔

۔

۔

۔

۔

۔

نسخہ

Rheubarb in powder $\frac{1}{2}$ dr سفوف ریوند چینی نصف ڈرام
 Carbonate of magnesia 1 dr کاربونیٹ اف میگنیشیا ایک ڈرام
 Essence of ginger 1 dr اے سینس اف جنجر ایک ڈرام

Compound Tincture of Cardamom $\frac{1}{2}$ oz کیونڈ ٹنگراف کارڈم نصف اونس
 Peppermint water $\frac{1}{2}$ oz عرق پودینہ ساڑھے پانچ اونس
 سب کو ملا کر نصف چھٹانک دن میں تین مرتبہ پلاویں گوشت سے پرہیز کرادیں۔
 شوربینی آب گوشت دیں یا گلی ہوئی بتلی کچڑی کھلاویں دستوں کے ہمراہ اگر
 درد شکم بھی ہو تو نمک کے ڈے کو گرم کر کے فلائین میں پیٹ کر مقام درد کو سینکیں
 یا گرم پانی کو بوتل میں بہر کر اور فلائین پیٹ کر سینک کریں بیروں کو گرم اور خشک
 رکھیں اگر اسہال زیادہ ہو تو فلائین کی چوڑی پٹی شکم پر باندھے رکھیں یہ مرض
 اکثر شکم میں سردی لگ جانے سے ہو جاتا ہے۔

لباس حاملہ عورتوں کو تنگ لباس پہنانا چاہئے بلکہ ڈھیلا لباس نہیں
 تاکہ شکم اور پستانوں کو بڑھنے کی گنجائش رہے تنگ محرم پہنے سے پستانیں
 چھوٹی رہ جاتی ہیں اور بھٹیاں ٹسکڑ کر دے جاتی ہیں اور دودھ پلانے میں ماں اور
 بچہ دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات بھٹیاں پک جاتی ہیں اور دودھ
 پلانے کے قابل نہیں رہتی۔

بعض اوقات حاملہ کے پیر اور ٹانگوں میں ورم آ جاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ گردے اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے یہ بات پہلو نیٹی کے حمل میں
 اکثر ہوتی ہے کبھی آنکھ کے پپوٹے بھی بہہ رہا جاتے ہیں اور حاملہ کے

مقام مخصوص میں بھی درم آجاتا ہے پیشاب کم آتا ہے اور رنگ اس کا سیاہی
مائل ہو جاتا ہے اگر علاج نہ کیا جاوے تو مرض بڑھ جاتا ہے اور پیشاب میں ایسوں
خارج ہونے لگتا ہے قارورہ کی شناخت کرنے سے ایسوں پایا
جاتا ہے اس صورت میں لیڈی ڈاکٹر سے قارورہ کی شناخت کرائی جاوے
اور علاج کرایا جاوے۔

غسل۔ حاملہ عورت ہر صبح کنگنہ پانی سے غسل کرے یا سفنج یا تولیہ کنگنہ پانی میں
بہگو کر سارے جسم کو صاف کر لیا کرے بعد غسل کمر دے تولیہ سے جسم کو خوب
رگڑ کر پونچھ ڈالا کرے چند منٹ میں غسل سے فارغ ہو جانا چاہئے غسل سے
حاملہ کی طبیعت خوش رہتی ہے اسقاط نہیں ہونے پاتا ہے اگر سمندر قریب
ہو تو اس میں غسل کرنا اور وہاں کی ہوا کھانا اور بھی مفید ہے۔

ہوا خوری۔ تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلنا پھرنا بھی مفید ہے زیادہ چلنا
اور تھک جانا مضر ہے اس سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہوتا ہے ہوا کے رخ
بھی نہ چلے اور نہ کھڑی ہو خانہ داری کا کام کرتی رہے۔ چلنے پھرنے اور ہوا
خوری کرنے سے وضع حمل جلد اور آسانی سے ہوتا ہے کوئی وقت پیش نہیں آتی
زینہ یا کسی اور بلندی پر چڑھنا یا کسی وزنی چیز کا اٹھانا البتہ مضر ہے۔ جو عورات
پنگ یا کرسیوں پر بیٹھتی رہتی ہیں چل پھر کر کام کاج نہیں کرتیں ان کے
وضع حمل میں اکثر دیر لگتی ہے اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے
غریب آدمیوں کی بیباں جلد اور آسانی سے فارغ ہو جاتی ہیں اور کانوں
کان بھی خبر نہیں ہوتی حاملہ عورتوں کے واسطے چلنا پھرنا گھر کا کاروبار کرنا تازہ
ہوا میں رہنا زیادہ مفید ہے انکی اولاد قوی اور تروتازہ ہوتی ہے۔ سستی
اور کاہلی سے طبیعت مغموم اور فکر مند رہتی ہے انکار سے دماغ خراب ہو جاتا

۴
۵
۶

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

نستی سب بیماریوں کی جڑ ہے کل خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں مایہ نولیا کا بڑا سبب
دماغ کا کام تیز نہیں کا ہے اگر یہ تیز نہیں اچھی جگہ خچ نہ کی جاوے تو بُرائی کی طرف لیجاتی
ہے اور سب خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔

مکان کا صاف اور ہوا دار رکھنا۔ عورتوں کو چاہئے کہ اپنے گھر کی خوب صفائی
رکھیں اور اسباب قریب سے رکھا کریں مکان صاف اور ہوا دار رکھیں ملازموں سے
خود کام لیں ہر کمرہ میں شب کو ایک ایک چینی یا الیمپ جلتا رہے دن کو ہر خالی کمرہ
کی کھڑکیاں کھلی رہیں مکان کا روشندان دن و رات کھلا رہے انسان کے تنفس
کے ساتھ جو ہوا اندر سے باہر آتی ہے وہ سخت زہر ہے اگر یہ ہوا کمرہ سے نہ نکالی
جاوے تو تدریج کم و بیش سانس کے ساتھ اندر جاوے گی اور نیز پسمند جوہر
انسان کے جسم سے دن و رات میں ایک سیر سے ڈیرہ سیر تک نکلا کرتا ہے غلج
نہ کیا جاوے تو کمرہ میں تعفن آنے لگے گائناک کو ناگوار معلوم ہوگا معدہ خراب
ہو جاوے گا صحت بگڑ جاوے گی خالق جزو کل نے ناک ہمارے واسطے متنبہ
اور خبردار کرینکے واسطے بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے آئینوالے ضرر سے ہم کو خبردار
کرے۔ تمام دافع عفونت اشیاء جو گندگی اور بود و دود کرنے کے واسطے کام میں لائی جاتی
ہیں جیسے کاربو لک اسڈ کا نڈی سلوشن کورڈز بسول مٹ آن سب سے
condy solution carbolic acid

قدرتی دافع عفونت اشیاء یعنی دھوپ روشنی اور ہوا بدرجہا بہتر ہیں۔
پس گندی بدبودار اشیاء کو جو ہماری ہلاکت کا باعث ہیں ناک کے ذریعہ معلوم
کر کے ان کو دور کریں اور تازہ ہوا روشنی اور دھوپ کے ذریعہ ان کے زہریلے
اغز کو زائل کریں اور صفائی کو کام میں لا دیں۔ سکونت کا مکان ایسا ہونا چاہئے
کہ روشنی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت بخوبی ہو ورنہ مکان ہمیشہ متعفن اور نرم

رہے گا۔ یہ ہرگز نہیں کھا جاسکتا ہے کہ دافع عفونت اشیا جن کا ذکر اوپر ہوا جیسے کاربوئک اسٹ اور کانڈی سلوشن وغیرہ بالکل بیکار ہیں۔ نہیں بلکہ تازہ ہوا اور روشنی اور دھوپ جو قدرتی دافع عفونت ہیں ان سے بدرجہا بہتر ہیں گندگی کے اثر کو نیست و نابود کرتی ہیں اور خود ناپاک نہیں ہوتیں جیسے تھیں ویسے ہی رہتی ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو ہمارے ضرر رساں چیزوں سے آگاہ کرینکے واسطے بنایا ہے ویسا ہی درد کو ہمارا ہاوی اور رہنما اور جانی دوست بنایا ہے۔ اگر درد نہ ہو تو ہم جلتا ہوا پانی پی بیویں یا آٹھکھ میں کنکری ڈال کر اندھے بن بیٹھیں یا آگ میں گر کر کر جل میں اگر درد نہ ہو تو بیماری کا علاج نہ کریں اور مر جاویں۔

اگر بہت سے آدمیوں کو ایک چھوٹے ٹوکڑے میں بند کر دیا جاوے تو یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کے جسم سے بدبو دار زہریلی ہوا پھیلے ٹیٹھکرتفس کے ذریعہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو کر زہریلا اثر پیدا کینگے جس سے غشی آجاوے گی بدبو آوے گی۔ دوسرے ہوگا اور بے انتہا تکلیف ہوگی چھوت دار امراض پیدا ہون گے پس ہوشیار عقلمند آدمی خواہ مرد ہو یا عورت اپنے مکان کی خوب خبرواری رکھے پانخانہ اور مابدان صاف رہیں۔ پانی رکھنے کی جگہ بہت دور ہو۔

راحت و آرام۔ حاملہ عورت آدھے آدھے گھنٹہ تک دن میں کئی مرتبہ پٹنگ یا آرام کرسی پر آرام کرے خصوصاً جبکہ اسقاط حمل کا خوف ہو یا جس کا شکم نیچے کو جھکا پڑتا ہو۔ تمام دوران حمل میں اسقدر آرام کرنا ضروری ہے شروع حمل میں آرام کرنے سے اسقاط حمل کا ہونا رک جاتا ہے اور آخر حمل میں آرام کرنے سے شکم کے بوجھ اور حجم کو سہارا ملتا ہے۔

غذا بعض عورات خیال کرتی ہیں کہ حاملہ ہونے سے دو جانیں ہو جاتی ہیں اس واسطے غذا زیادہ ہونا چاہیے یہ خیال غلط ہے اول تو حمل ہوتے ہی

آرام سے
تو بخاتی

بغالی

سوں سے

سالی کرہ

کے تفس

تہ نکالی

بیسہ جوہر

اسے غلج

ہ خراب

مطے متنبہ

ہکو خبردار

میں لائی جاتی

سب سے

بہتر ہیں۔

ذریعہ معلوم

انکے زہریلے

ما ہونا چاہیے

فن اور نم

خون حیض بند ہو جاتا ہے جو اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ اور شروع میں جنین صرف ایک نقطہ ہوتا ہے یا خون کی ڈلی اسکو غذا کی کیا حاجت علاوہ بریں شروع حمل میں حاملہ بیمار سی رہتی ہے زیادہ کھانا ہضم نہیں کر سکتی زیادہ کھانے سے علت بڑھ جاتی ہے سینہ جلنے لگتا ہے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے اس وقت قدرت خود زیادہ کھانے کی مانع ہوتی ہے اور جب جنین بڑا ہو جاتا ہے یعنی جب بچہ شکم مادر میں حرکت کرنے لگتا ہے تو البتہ اُس وقت غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں حاملہ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اور کھانا ہضم بھی ہونے لگتا ہے۔ یہ سب قدرت کے کاروبار ہیں قدرت خود موقع موقع پر رہنمائی کرتی ہے۔ اُس وقت چونکہ جنین جلد جلد بڑھتا ہے اور حاملہ یہ نسبت سابق زیادہ تندرست ہوتی ہے اسلئے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم بھی کر سکتی ہے پس ایسی موقع پر غذا کی مقدار زیادہ ہونا چاہئے مگر ہلکی اور زود ہضم ملائم غذا جس میں غذایت بخش اجزاء زیادہ ہوں کھلاویں جیسے تازہ دودھ نشاستہ دارا غذیہ جیسے چاول ساگو دانہ بیجٹہ اچھے پھل پھل پھلے ہوئے سیب پختہ ناشپاتیاں رس بہریاں اسٹابری انگور انجیر خشک املی بیجٹہ بیر گوز بیر سی کاگو دہ تارنگی کاگو دہ حاملہ کے واسطے بہت مفید ہیں ان چیزوں سے تشنگی رفع ہو جاتی ہے قبض نہیں ہونے پاتا حاملہ کو سادہ کھانا اول بیکر کھلانا چاہئے ایک ہی کھانا ہر روز نہ دیا جاوے حاملہ کو چاہئے کہ اپنی صحت خصوصاً پچھلے ایام حمل میں خود درست رکھے تاکہ وقت وضع حمل آسانی ہو اور بعد میں دودھ اچھی طرح اوترے اور دودھ پلانے کے زمانہ میں ماں اور بچہ دونوں اچھے اور تندرست رہیں اس کے واسطے صرف سادہ زندگی بسر کرنا خانہ داری کا کاروبار کرتے رہنا تازہ ہوا میں چھنا پھرنا سادہ غذایت بخش خوشگوار غذا کھانا پاک صاف رہنا بیخ و افکار سے دور رہنا کافی ہے۔

سونا۔ حاملہ کے سونے کا کمرہ صاف اور ہوادار ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں کھلی
رہیں مہری نہ لگائی جاوے دن کے وقت بسترہ دھوپ اور ہوا میں پھیلا دیا جائے
شب کو سوتے وقت کمرہ کے قریب شور و غل نہ ہو تاکہ آسائش سے نیند آوے
ہیمپ گل کر دیا جاوے۔

بعض اوقات حاملہ کو شب کو گرمی اور یخینی معلوم ہوتی ہے اس صورت میں
پلنگ پر ضرورت سے زائد کپڑے نہ ہوں موسم گرمیوں میں اپریل کی کھڑکیاں کھلی رہیں
اور موسم سرما میں صرف چند انچ کھلی رہیں اگر کمرہ بڑا ہو تو کھڑکیاں بند کر دیں۔ دروازہ
نیم والوں چیت کا روشندان شب بھر کھلا رہے اگر قبض ہو تو سوتے
وقت ملیں دوا دیجاوے پختہ تازہ پھل بھلاویں۔ غذا سادہ ہو کچھ دیر تک
چھل قدمی کرنا چاہئے موسم سرما میں ہر صبح گرم پانی میں اسفنج بھگو کر جسم کو صاف
کر لیا کریں۔ اور گرمیوں میں سرد پانی سے جسم کو صاف کر لیا کریں یٹنے میں اگر تکلیف
ہوتی ہو اور دم گھٹتا ہو تو پلنگ پر تکیے لگا کر آرام سے سولاویں۔

حاملہ کو کبھی شب کو درد شکم معلوم ہوتا ہے اور ناخوشیہ کار عورت دروزہ خیال کرتی
ہے ایسی حالت میں قدرے صبر کرنا چاہئے۔ کوئی دست اندازی نہ کریں اگر درد
زیادہ ہو تو فوراً دای کو بٹاویں۔ حاملہ کو چاہئے کہ صبح کو ادا دل وقت اٹھا کرے تاکہ
غسل کر سکے اور خانہ باغ یا ہوادار میدان میں آہستہ آہستہ ٹہلے کھانا بھی
اول وقت کھاوے۔

بعض حاملہ عورت کو ہر وقت نیند آتی ہے غنودگی لگی رہتی ہے اس صورت
میں تازہ ہوا میں ٹہلے گھر کا کام کاج چل پھر کرے اس سے غنودگی جاتی رہیگی۔
اور خوش و خرم اور تندرست رہیگی۔

میں صرف

روح عمل

سے علت

خود زیادہ

م مادیوں

ہے۔ ایسے

۔ یہ سب

قت چونکہ

شہا بھی

مقدار زیادہ

دہ ہوں

جتنے اچھے

ری انگور

ت مفید ہیں

مادہ کھانا

کہ اپنی صحت

ہو اور بعد

دونوں

فائدہ داری

نگو اور غذا

استقاط حمل

مقدم بات یہ ہے کہ حاملہ خود اپنی حالت کو سنوارے رکھے اور کل اُن اسباب سے جسے استقاط حمل ہو جاتا ہے بچائے رکھے استقاط کا ہونا کچھ ہلکی بات نہیں بلکہ یہ حادوثہ عظیم ہے جس سے جنین تلف ہو جاتا اور حاملہ کی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔

اسباب۔ واضح ہو کہ اکثر اوقات ادنیٰ سبب سے بھی جنین کا تعلق رحم مادر سے جدا ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو کر خارج ہو جاتا ہے۔ دُور تک پیدل چلنا گھوڑے کی سواری کرنا ہموار سڑک پر گاڑی میں لمبا سفر کرنا۔ ریل گاڑی میں لمبا سفر کرنا۔ شب کو عرصہ دراز تک بیٹھا رہنا۔ جماع بکثرت کرنا۔ بلند ٹلی سے کودنا یا گرنا۔ دلی رجوش۔ غصہ۔ خوف۔ بے رحم۔ زیادہ تکان۔ وقتاً بہ وقتاً بکجا ہونا۔ زینہ پر چڑھنے اُترنے میں پیرو کا چوک جانا۔ سیڑھی پر سے کودنا۔ بہاری بوجھ اٹھانا۔ تیز سہل لینا۔ بار بار پیش کش کا ہونا۔ آتشک کا ہونا ضعف رحم یا مرض رحم ہونا۔ قبض کا زیادہ ہونا۔ ضعف و نقاہت کا ہونا۔ طبیعت کا مرض سل کی طرف مائل ہونا۔ تنگ پوشاک پہنا اور کل اسباب جو جسم اور دلی خیالات کو خراب کریں ہونا۔ ریل کا سفر اور دیگر اسفار اسی حالت میں مضر ہیں جبکہ حاملہ کا میدان استقاط کی طرف ہو یعنی اُس کو اکثر استقاط ہو کر رہتا ہو۔ یا مقرب وضع حمل ہونے والا ہو استقاط کا کرنا بعد میں علاج کرانے سے بدرجہا بہتر ہے۔

علامات استقاط حمل۔ استقاط ہونے سے ایک یا دو دن قبل حاملہ سُستی کمزوری ضعف و نقاہت محسوس کرتی ہے۔ دل بیٹھا جاتا ہے۔ کمر اور بائیں۔ کولہ اور شکم کے زیریں حصہ میں نیچھتی معلوم ہوتی ہے۔ اُس وقت اگر لایق معالج ملے تو یقیناً استقاط حمل رک جاتا ہے اگر یہ وقت گزر جاوے اور علاج

نہ کیا جاوے تو ایک یا دو روز بعد قدرے خون دکھلائی دیتا ہے۔ پھر یہ خون بڑھ کر پرنالہ سا جاری ہو جاتا ہے جو تھوڑے عرصہ میں منجمد ہو جاتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا درد بھی ہونے لگتا ہے اس وقت اسقاط حمل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وقت بھی اگر کسی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا جاوے تو ممکن ہے کہ اسقاط نہ ہو۔ اور اگر اسقاط ہو بھی جاوے تو مریضہ کو خطرناک اور خراب حالت میں مبتلا ہونے سے بچا لیوگی اور ایسا انتظام کریگی کہ آئندہ کو اسقاط نہ ہو۔

شروع میں خفیف بے قاعدہ پینے کا سادہ ہوتا ہے پھر یہ درد بڑھ کر باقاعدہ نیچے اترنے کا سادہ ہونے لگتا ہے اس وقت جنین رحم مادر سے جدا ہو رہا ہے اور مریضہ کو اسقاط کا یقین ہو جاتا ہے۔ اسقاط حمل کے دو درجے ہوتے ہیں۔ اول جنین کا رحم مادر سے جدا ہونا۔ دوسرا جنین کا رحم مادر سے خارج ہونا۔ اول درجہ میں رحم کی باریک بلدیک وریڈیں جن کے ذریعہ جنین کا علاقہ رحم مادر سے ہوتا ہے ٹوٹنے لگتی ہیں اور کم یا زیادہ خون جاری ہوتا ہے۔

دوسرے درجہ میں علاوہ اخراج خون کے درد بھی ہوتا ہے اور جنین رحم سے جدا ہو کر خارج ہو جاتا ہے۔ اسقاط حمل میں اخراج خون اور درد دونوں کا ہونا لازمی ہے جب خون بند ہو جاوے اور درد موقوف ہو جاوے تو معلوم کرنا چاہئے کہ جنین رحم سے نکل گیا کو ابھی باہر نہ آیا ہو اپنی گز گاہ میں ٹکا ہوا یا اپنے آپ نکل جاویگا۔ علاج کی ضرورت نہیں۔

اکثر تو آٹھ ہفتہ سے لیکر بارہ ہفتہ تک کا حمل اسقاط ہوتا ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ کل ایام میں اسقاط ہو سکتا ہے چار ماہ سے قبل کا حمل اگر اسقاط ہو تو چنیدار خطرناک نہیں تاہم اگر علاج میں غفلت کیجاوے تو مریضہ کی صحت خراب ہو جائیگا اندیشہ ہے اور گاہ گاہ ہلاک بھی ہو جاتی ہے چار ماہ کے بعد اگر اسقاط

باب سے
ایک
بلکہ
بجائی
لمق رحم
پیدل
گاری
ٹی سے
ٹا بکا ہونا
بوجہ اوٹھنا
حم ہونا۔
نا ہونا۔
نا۔ ریل
فت ہو
لاکارگنا
ستی
نین۔
رلائق
علاج

ہو تو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں زیادہ خون نکلتا ہے اس وقت بھی اگر اچھے معالج سے رجوع کیا جاوے تو مریضہ کی جان بچ سکتی ہے اس کے علاج میں معولی وضع حل سے زیادہ ہوسشیاری درکار ہے۔

اگر نیچے اترنے اور زمین کے ٹکٹے کا سادہ ہوا درخون بھی نکلتا ہو اور اس کا نکلنا زیادہ ہوتا جاوے اور خون کے لو تھڑے باہر آنے لگیں اور پستان چھوٹے اور ملائم ہو جاویں اور پستانوں کا دودھ جو کبھی قدر پہلے سے موجود تھا دفعتاً خشک ہو جاوے شکم سرد اور اس میں گرانی میں معلوم ہو اور چھوٹا ہو جاوے اور شکم میں جنس کی حرکت معلوم نہ ہو اور اندام ہنانی سے ناگوار مواد خارج ہو تو جاننا چاہئے کہ شکم مادر میں پتھر مریا اور ضرور خارج ہوگا۔ ایسی حالت میں لیڈی ڈاکٹر کو فوراً بلاویں بعض اوقات اسقاط حمل شروع ہونے سے آخر تک پانچ یا چھ روز اور گاہ گاہ پندرہ روز کبھی تین ہفتہ گزر جاتے ہیں۔

علاج۔ جب مریضہ کو ذرا سا بھی خون دکھلائی دے تو فوراً سرد مکان میں علیحدہ آرام کر سی لیگٹری چار پانی یا سخت پھونے پر چیت یا کروٹ سے لٹا دیں جامع سے پرہیز کریں اگر پرہیز نہ کریں تو اسقاط حمل لازمی ہے غذا، ملکی ملائم زود ہضم مثل ساگو دانہ اربوٹ ٹاپنی اوکا، کچھڑی دودھ چاول چار انگور وغیرہ کھلاویں دستاورد و اہر گز نہ دیں۔ ۳۔ بوند کلوروڈین *Chlorodyne* ایک اونس پانی میں ملا کر پلاویں اور بعد ازاں یہ نسخہ دیں۔

Dilute sulphuric acid ۱۵ بوند *15 drops* بوند

Tincture ginger ۱۰ بوند *10 drops* بوند

پانی ایک اونس ملا کر دن میں تین مرتبہ پلاویں۔ *Water 1oz*

to be taken three times a day

یا پتھر
نکلتے

ہو تو

جو

چیز

اکثر

لو تو

و

تک

غذا

بعض

تو

غذا

س

زیادہ

میر

جی

بک

و

کر

خ

یا پٹگری ایک ڈرام پانی آٹھ اونس ملا کر اس میں سے ایک ایک اونس چار چار گھنٹے بعد پلاویں سرد پانی میں کپڑا بھگو کر اندام نہانی پر رکھیں اگر آتشک کے سبب ہو تو آیوڈائیڈن پٹاسیم پانچ کریں ایک اونس پانی ملا کر دن میں دو مرتبہ پلاویں جو چیز اندام نہانی سے نکلے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو دکھلاویں۔ کیونکہ جیتک ہر ایک چیز جو خارج ہو دکھلائی نہ جاوے تو وہ سرگز نہیں کھ سکتی کہ جنین خارج ہو یا نہیں اکثر اوقات مریضہ جانتی ہے کہ جنین خارج ہو گیا حالانکہ وہ صرف ایک خون کا ٹوٹہڑا ہوتا ہے جس کو وہ جنین خیال کرتی ہے بعد اسقاط حمل کل تدا بیر جو بعد وضع حمل کی جاتی ہیں کرنا چاہئے ہلکی غذا و بجاوے مریضہ آٹھ یا دس روز تک پندنگ پر لیٹی رہے۔ ایک لایق اور ہوشیار عورت اُسکی نینمار داری کرے غفلت کرنے سے اُس کی صحت خراب ہو جاوے گی۔

بعض عورت کو اسقاط کی عادت ہوتی ہے یعنی حمل کے ایک خاص وقت استقاط ہو جا یا کرتا ہے تو حاملہ ہو نیسے پہلے اُسکو چاہئے کہ اپنی صحت کو قوی اور بحال کرتی رہے مقوی ملائم غذا و مضم غذا کھاوے بالونکے گدے یا تو شک پر ہوا دار مکان میں سوئے ہو ادا ر جگہ میں ٹھکا کرے صبح کو سرد پانی سے غسل کرے جب حاملہ ہو جاوے تو دن میں اکثر لیٹی رہے دلی خیالات کو زیادہ دخل نہ دے غذا ہلکی کھاوے گوشت اور گرم چیزوں سے بیز کرے شروع ہی رات میں سو رہا کرے مجامعت نہ کرے مسہلات کا استعمال نہ کرے اگر ضرورت ہو تو ہلکا ملین۔ جیسے دلائی انڈی کاتیل کم مقدار میں پی لے تاکہ قبض رفع ہو جاوے کیونکہ قبض کا ہونا بھی مضر ہے زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرے ریل گاڑی میں لمبا سفر نہ کرے در یائی سفر بھی مضر ہے جب وہ وقت آوے کہ جس میں اس کو اسقاط ہوا کرتا ہے تو زیادہ ہوشیار ہو جاوے اکثر لیٹی رہے دل و دماغ کو تفکرات اور خیالات سے پاک رکھے سونے اور بیٹھنے کا مکان ہو اوار ہو قبض نہ ہونے

راجھے
میں مانی

کا نکلنا
ٹے اور
ماٹشک
ور شکم
اتنا چاہئے
فوراً پلاویں
پندرہ روز

علیحدہ آرام
پر ہیز کریں
دانہ اراد
بز نہ دیں
بلاویں اور

di
in
wa
to

پاؤں اگر ہو تو صرف گرم پانی سے حقنہ کر کے اسرار کو صاف کرے اگر اسقاط کا ذرا سا بھی شیبہ ہو یعنی کوئلہ مکر یا شکم کے زیریں حصہ میں درد معلوم ہو یا ذرا سا بھی خون دکھلا دیے تو فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلاوے تاکہ وہ معقول علاج کرے۔

درد زہ کا ذب

بعض حامد عورتوں کو خصوصاً پہلو ہٹی کے حل میں کبھی کبھی دو یا تین ہفتہ قبل وضع حمل کے اکثر رات کو سبب تصور یا ضہ کے شکم پشت مکر اور کوہوں میں درد ہوتا ہے جو اکثر انہوں تکبیل جاتا ہے یہ درد کبھی ایک جگہ ہوتا ہے اور کبھی دوسری جگہ اور دو درد نکا درمیان وقفہ بے قاعدہ ہوتا ہے یہ درد کبھی شدید اور کبھی خفیف ہوتا ہے اور اس کی کیفیت نشہ منجی درد کے مانند مثل قلعج کے درد کے ہوتی ہے کبھی اس درد کے ختم ہوتے ہی اصلی درد شروع ہو جاتا اور معمولی وضع حمل ہوتا ہے مریضہ خیال کرتی ہے کہ اصلی درد زہ اسقدر عرصہ تک ہا مگر درحقیقت یہ بات نہیں بلکہ پہلے درد زہ کا ذب ہوتا رہا اور اس کے ختم ہوتے ہی اصلی درد زہ شروع ہو گیا اور وضع حمل ہوا

درد زہ کا ذب اور اصلی درد زہ کا فرق

درد زہ کا ذب	اصلی درد زہ
وضع حمل سے تین یا چار ہفتہ قبل شروع ہوتا ہے خون دکھلائی نہیں دیتا۔	اکثر پیٹھ سے شروع ہوتا ہے۔
منتقل ہوتا رہتا ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ پہلے کمر میں پھر کوئلہ میں پھر شکم کے زیریں حصہ میں اور کبھی شکم کے اور مقامات	پیشے کے درد سے مشابہ ہوتا ہے۔
	منتقل ہوتا رہتا ہے اس کی تیزی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے۔

میں مثل تشنجی درد کے ہوتا ہے۔

دردوں کا اور میانی وقفہ بڑھ چکا ہوتا جاتا ہے

بے قاعدہ اوقات میں ہوتا ہے۔ یعنی
دو دردوں کا اور میانی وقفہ ایک سا نہیں ہوتا
کبھی ۵ منٹ کبھی ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ
ہوتا ہے۔

خون دکھلائی دیتا ہے۔ یہ بڑی قوی
علامت ہے۔

تیز مثل تشنجی دھونے کے ہوتا ہے
اور کبھی خفیف۔

علاج۔ اکثر تو ایک خوراک ارند می کا تیل دینا کافی ہوتا ہے۔ اگر درد قائم رہے تو
رات کو سوتے وقت روغن کا فور گرم کر کے شکم پر مالش کر دیا کریں یا نمک کے ڈبے
کو گرم کر کے فلائین کے ٹکڑے میں پیسٹ کر یا ربڑ کی بوتل میں گرم پانی بہر کر شکم
کو سینک کریں اور ڈیڑھ اونس پانی میں ۲۰ گرین کلورال ہیڈریٹ ملا کر سوتے وقت
پلاویں اگر آرام نہ ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

ایام حمل

عموماً حمل کی مدت ۲۷۵ دن چالیس ہفتہ اور قمری حساب سے دس ماہ اور شمسی
حساب سے ۹ ماہ ہوتے ہیں اس کا شمار پہلے حیض کے موقوف ہونے کے تین
دن بعد سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اکثر حمل اسی وقت قرار پاتا ہے فرض کرو
کہ ۱۵ جنوری کو حیض بند ہوا تو اس حساب سے ۲۷۵ اکٹوبر کو وضع حل ہونا چاہئے
یعنی ۲۸۳ دنین جو لقمہ تشریح حمل وضع حل تک کا اصل کتاب میں درج ہے اس
کے حساب سے ۲۷۵ دن سے کچھ زائد یعنی ۲۸۰ دن ہوتے ہیں جس میں تین
دن اور شامل کر کے ۲۸۳ دن ہو جاتے ہیں مثلاً اگر ۱۵ جنوری کو

سائیکل

سائیکل
میں
بہتر
تدبیر
درد
ور
کے
ہا
ہے

ہے
ہے
یافتہ

عبداللہ

حیض آنا موقوف ہوا تو دس اکتوبر کو ۲۷ دن اور اگر اس سال میں فروری چننے
 ۲۵ دن کا ہو تو ۲۷ دن ہوں گے ان میں پانچ روز اور ملاو اور اگر فروری ۲۸
 دن کا ہو تو ۲۸ دن ہوں گے اس حساب سے ۱۵ اکتوبر کو وضع حل ہونا چاہئے
 یا ۲۹ مارچ کو حیض بند ہوا تو ۲۹ دسمبر کو ۲۷ دن ہوئے ان میں تین دن
 اور ملاو تو ۲۷ دن ہوں گے اس حساب سے یکم جنوری کو ولادت ہونی چاہئے
 اگر حیض بند ہونے کی تاریخ لکھ رکھی جاوے تو شمار میں کچھ وقت واقع نہیں ہوتی گاہ
 گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حل کو ۲۵ ہفتہ لگاتے ہیں اس کے بعد وضع حل ہوتا ہے
 اور ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف ۲۸ ہفتے کے بعد زندہ اور زندہ رہنے والا بچہ پیدا ہوا
 ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ صرف ۲۶ ہفتے میں بچہ پیدا اور ڈیڑھ ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہوا
 بعض اوقات حالت رضاع یعنی دودھ پلانکی حالت میں حل قرار پاتا ہے اور چونکہ
 اس وقت میں حیض نہیں آتا اس واسطے حاملہ حل کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتی اور جب
 بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے تو اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ پندرہ روز کم نصف ایام
 حل کے گزر گئے اور ایک سو چھپن دن وضع حل کے اور باقی رہے فرض کرو کہ
 ۱۷ مئی کو جنین نے شکم مادر میں حرکت کی تو ۲۳ اکتوبر یا اس کے قریب قریب
 ولادت ہونی چاہئے مگر یہ حساب ایسا صحیح نہیں ہے جیسا کہ حیض بند ہونے سے
 لگایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حاملہ ہونے کے ایک ماہ بعد قدرے
 خون دکھلائی دیتا ہے اور حاملہ اس خون کے موقوف ہو جانے کے بعد سے حمل
 کا شمار کرتی ہے اور حساب غلط ہو جاتا ہے چاہیے تھا کہ اس خون کو شمار میں
 نہ لائے۔

شکم مادرین لڑکا ہے یا لڑکی

یہ سوال کبھی ڈاکٹر سے کیا جاتا ہے اصل حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے مگر بعض حکماء نے تجربہ سے معلوم کیا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو حاملہ خوش رنگ ہلکی پھلکی ہوگی شکم گول ہوگا حل کا بوجھ دہنی کو کہہ کی طرف زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر لڑکا دھنی جانب ہوتا ہے حاملہ اچھی طرح کھانا کھاتی اور میضہ کرتی ہے گوشت سے نفرت نہیں کرتی۔ بخلاف اس کے اگر لڑکی ہوتی ہے تو حاملہ کارنگ پیلا بیماری کا سا ہوتا ہے۔ سینہ جلتا ہے حل بھی بیماری کا سا معلوم ہوتا ہے دروزہ پشت کی طرف سے شروع ہوتا ہے حل کا بوجھ بائیں جانب زیادہ ہوتا ہے اور وضع حل میں دیر لگتی ہے یہ سب باتیں محض قیاسی ہیں حقیقت حال اللہ جانے۔

دائی

دائی کا اپنے فن میں تعلیم یافتہ اچھا اور لائق ہونا زچہ اور بچہ دونوں کے واسطے از حد ضروری ہے پس دائی شاکستہ خوش مزاج مہربان اور اپنے کام میں ہوشیار چست و چالاک خلیق ملائم مزاج ملائم زبان ملائم ہاتھ زچہ اور بچہ دونوں کو آرام اور آسائش سے رکھنے والی ہو اگر زچہ سو جاوے تو اُس کو کھانے یا کسی اور کام کے واسطے نہ جگاوے۔ کیونکہ سونے سے صحت اور طاقت دونوں بحال رہتی ہیں بہت بونے اور بیک بیک کرنے والی نہ ہو اس سے زچہ کو سخت تکلیف پہنچتی ہے تندرست ہو کسی قسم کا عارضہ نہ ہو جسم اور لباس کو پاک صاف رکھے اور زچہ خانہ کی ہر چیز کو پاک صاف اور ترتیب سے رکھے

جینہ
۲۸
اے
ن
پے
گاہ
ہے
یا ہوا
نہوا
چوہ
پرب
یام
وہ
فیرب
سے
ے
صل
ماریں

اور دافع عفونت ادویہ سے مکان صاف اور بوبانس سے پاک رکھے میلے پچیلے کپڑے
 گودڑ گاڈر زچہ کے پلنگ کے نیچے یا اوپر مکان کے کونوں میں نہ ڈالے زچہ خانہ میں
 کھانے پینے کی برتنوں کو پھار دھوئے نہ دے زچہ کے پاس بہت سے آدمیوں کو جمع ہونے
 نہ دے لوگوں کو بار بار آنے جانے نہ دے مکان کو ہوا دار رکھے بلا اجازت ڈاکٹر زچہ یا بچہ کو
 کوئی دوا نہ دے پچے کے پوتے خوب ہو کر اور دافع عفونت ادویہ کھاتا اور بوبانس سے پاک کر کے خشک کر کے
 رکھے زچہ پلنگ کوئی کپڑا نہ بیگنے دے الگ کوٹنگھی کے باہر نہ گرنے دے کمرہ کی حرارت کو جہاں تک
 ہر کے یکساں رکھے زچہ کے سونے کی حالت میں بچہ کی حفاظت کرے زچہ کے مقامات
 خاص کو صبح و شام گرم پانی سے دھو کر صاف رکھے اور شکم پر باقاعدہ بیٹی صبح
 و شام دونوں وقت اس طرح باندھے کہ نہ بہت کمی ہو اور نہ ڈھیلی جس سے زچہ کو
 آرام اور تسکین رہے اور پیٹ ڈھیلا نہ رہے ایسی دوائی کو فیاضی کے ساتھ حق بہت
 دینا چاہئے اور اس کی آسائش اور آرام کا خیال رکھنا چاہئے۔

وضع حمل کی تیاری

وضع حمل کی علامات شروع ہوتے ہی ضروری سامان تیار کرنا چاہئے جیسے کپڑا چادر
 رو مال صاف ہوا دار کمرہ پلنگ اور دوائی حاضر ہو۔

تھکم مادر میں جنین ایک پگڈار جھلی کے غلاف میں جس میں پانی بہا ہوتا ہے رکھا
 ہوتا ہے اور جنین کا آلہ رحم کے اندرونی سطح میں بذریعہ باریک باریک رگوں کے
 چسپاں رہتا ہے اور اس میں سے رگوں کی ایک ڈوری نکل کر جنین کی ناف میں
 شامل ہو جاتی ہے جس کو نال کہتے ہیں اس کے ذریعہ جنین کی پرورش ہوتی
 ہے یعنی ماں سے بچہ تک اور بچہ سے ماں تک خون کی آمد و رفت جاری رہتی ہے
 اور رحم کا منہ بند ہوتا ہے جب وضع حمل ہو نیوالا ہوتا ہے تو رحم بار بار سکڑتا ہے

جس سے بچہ رحم سے باہر آجاتا ہے اس سگڑے زچہ کو درد معلوم ہوتا ہے جس کو
 درد زہ کہتے ہیں رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور پھٹی کا غلاف ٹوٹ کر پانی نکل جاتا اور
 رفتہ رفتہ بچہ باہر آجاتا ہے اب اس وقت کچھ عرصہ کے واسطے درد موقوف ہو جاتا
 اور پھر ہونے لگتا ہے مگر پہلے کی نسبت سے کم اس پچھلے درد سے آئول - اور پھٹی
 وغیرہ سب خارج ہو جاتی ہے وضع حمل سے ایک دو روز قبل حاملہ کی حالت پہلے
 کچھ اچھی ہو جاتی ہے یعنی رحم پیچھ کو جھک آتا ہے اور شکم کا بالائی حصہ خالی ہو جاتا ہے
 جس سے سانس اچھی طرح آنے لگتا ہے آرام اور لہکا پن معلوم ہوتا ہے حاملہ پہلے پچھلے
 اور کام کاج کرنے لگتی ہے لباس نل کو وضع حمل کی تیاری کرتی ہے مگر بعض سکی خلا گجڑی سی
 جب پچھنیچے اوترا آتا ہے تو بار بار اجابت ہوتی ہے اور اعمار صاف ہو جاتی ہیں
 جس سے بچہ گزرنے کی واسطے زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے اگر قدرتی طور پر ایسا نہ ہو
 تو مناسب ہے کہ مسہل یا حقنہ کے ذریعہ شکم کو صاف کریں اسی طرح مثانہ پر بھی
 بچہ کا دباؤ پڑتا ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے یہ بھی بچہ کی گزرا گاہ کے فراخ ہونے کا
 قدرتی ذریعہ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وضع حمل قریب ہے بعد اس
 کے اندام بہانی تر ہو جاتی ہے اور خفیف سا درد معلوم ہوتا ہے اور رطوبت کے
 ہمراہ قدرے خون دکھائی دیتا ہے بعد اس کے پینے کا سا درد ہونے لگتا ہے
 یہ درد کبھی دو گھنٹہ اور کبھی ایک یا نصف گھنٹہ کے فاصلہ سے ہوتا ہے بعد اس کے
 رفتہ رفتہ درد تیز اور باقاعدہ اور جلد جلد ہونے لگتا ہے اکثر زچہ کو اس وقت سردی
 سے لرزہ آجاتا ہے اور دانت بجنے لگتے ہیں یہ بات اندیشہ ناک نہیں اور
 نہ یہ اصلی سردی ہے اور نہ جسم سرد ہوتا ہے بلکہ بدن گرم ہوتا ہے
 اور پسینہ آجاتا ہے اس وقت صرف گرم گرم چار پلا دینا چاہیئے اور ضرورت ہو تو
 ایک رضائی اوپر سے ڈال دی جاوے رضائی کے کنارے ہر طرف سے اند کو

بیکہ پڑے
 نہ میں
 ہونے
 رہا بچہ کو
 سکر کے
 جہانک
 قانات
 صبح
 چہ کو
 بہت
 خد

اچا دور
 رکھا
 س کے
 میں
 ہوتی
 نا ہے
 نا ہے

و بادئیے جاویں جب مریضہ گرم ہو جاوے اور پسینہ خشک ہو جاوے تو رضائی کو اتار
ڈالیں۔

اس موقع پر کبھی متلی بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات علاوہ متلی کے تھے بھی ہوتی ہے
یہ متلی کبھی آخر تک قائم رہتی ہے تھے اور متلی کا ہونا اچھی علامت ہے جس سے معدہ
خالی ہو جاتا ہے اور وضع حمل آسانی سے ہو جاتا ہے بعد وضع حمل تھے اور متلی
خود بخود جاتی رہتی ہے۔ اس موقع پر زچہ کا کوٹھنا مناسب نہیں بجائے اس کے
کہ بچہ جلد پیدا ہو دیر میں ہوتا ہے اور مریضہ کمزور ہو جاتی ہے اس وقت حاملہ کو
چلنا پھرنا چاہئے یا بیٹھ جاوے لیٹی نہ رہے اگر شروع دروزہ میں پانی نکل جاوے
اور درد موقوف ہو جاوے تو فوراً لیڈی ڈاکٹر کو معائنہ کراویں تاکہ معلوم ہو کہ بچہ
کس ہیت سے پیدا ہوگا کچھ عرصہ بعد پینے کا سا در بدل کرا دترنے کا سا
درد جلد جلد باقاعدہ ہونے لگتا ہے جلد گرم ہو جاتی ہے اور پسینہ آجاتا ہے۔
یہ اصلی دروزہ ہے۔

حکمرانے اصلی دروزہ کے تین درجے قرار دیئے ہیں۔ پہلے درجہ میں رحم نیچے
کو اترتا ہے اور خون دکھلائی دیتا ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس میں دہن
رحم اس قدر کشادہ ہوتا ہے کہ بچہ کا سر نکل سکے اس وقت پینے کا سا درد معلوم
ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے جس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت درد کسی چیز
کے بچکنے کا سا ہوتا ہے۔ پہلا درجہ زیادہ عرصہ تک رہتا ہے۔ اس میں حاملہ کو چلنا
پھرنا اور گہرا کام کرتے رہنا چاہئے۔ دوسرے درجہ میں بھی مریضہ ٹھہرتی رہے یا بھی
لیٹک یا آرام کرسی پر بیٹھ جاوے لیٹ نہیں اور نہ کو تھے بعض اوقات یہ
درد گندہ بیماری اور گران معلوم ہوتا ہے اور زچہ کراہتی اور آہ آہ کرتی ہے
اس سے درد میں تخفیف ہو جاتی ہے پس زچہ کو چلانے دینا چاہئے۔ ایسی حالت

میں بھی کو تنہا نہیں چاہئے مگر جب درد بہت شدت کا ہو اور بچہ نیچے اوترتا معلوم ہو اُس وقت البتہ مریضہ دم زدک کر کوئٹھے اس وقت سے پہلے کوئٹھے میں خوف ہے کہ شاید رحم ہیٹ جاوے اور خطرناک نتیجہ پیش آوے تدابیر مذکورہ بالا سے مریضہ کم تھکتی ہے اور وضع حل آسانی سے ہو جاتا ہے۔

درد زہ کی حالت میں پنڈلیوں اور رانوں میں اکثر تشنج ہونے لگتا ہے خصوصاً جبکہ عرصہ تک زچہ ایک ہیست پر رہے اس واسطے شروع درد زہ میں زچہ کو ٹھلنا چاہئے تشنج کا دورہ اکثر درد زہ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس وقت زچہ کو درد زہ اور تشنج دونوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہ تشنجی درد خطرناک نہیں بلکہ بچہ کے اترنے کی علامت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کولہ کے تنگ اور مشکل مقام سے گذر کر باہر آگیا اور وضع حل کا مشکل وقت بکل گیا دانی کو چاہئے کہ ہاتھ کو گرم کر کے تشنج کے مقام کو ملے اور بچہ اگر زیادہ اتر نہ آیا ہو تو زچہ کی نشست کو بدل دے اور کبھی یا آرام چوکی پر بیٹھا دے یا اگر ہو سکے تو کمرہ کے اندر بیٹھا دے ایک آدمی اسکو سہارا دیتا رہے اگر اس حالت میں درد زہ اور تشنجی درد دونوں ستاویں تو چارپائی کی پٹی یا ستون وغیرہ پکڑ لے یا جس پیر میں تشنج ہو اُس پیر کی اڑھی کو زمین پر زور سے جاکر پنڈلی اور رانوں کو خوب سیدھا کرے اس ترکیب سے تشنج جاتا رہیگا۔

چونکہ درد زہ کو التمد نے اسی واسطے بنایا ہے کہ بچہ کو اندر سے باہر نکلے اس واسطے اس میں بلا ضرورت دست اندازی نہ کیجاوے اللہ تعالیٰ سب کام خود درست کر دیتا ہے پسینے کے درد سے بچہ کی گزر گاہ کشادہ اور ملائم ہو جاتی ہے پہلو ٹہنی کا بچہ ان بچوں سے جو بعد میں پیدا ہوں تقریباً دو چند عرصہ میں پیدا ہوتا ہے اور پھر بعد کا بچہ ہر پہلے بچے سے ذرا جلدی ہوتا ہے۔ مگر یہ بات ہمیشہ نہیں ہوتی کبھی

فی کو اتار

ہوتی ہے

سے معدہ

اور مثلی

اس کے

ت حاملہ کو

کل جاوے

ہو کہ بچہ

کا سا

تا ہے۔

جم نیچے

بن دہن

سا در معلوم

رو کسی چیز

حاملہ کو چلنا

رہے یا بھی

وقات یہ

تی ہے

نہ۔ ایسی حا

اس کے خلاف بھی ہوتا ہے یعنی پہلا بچہ جلد اور بعد کا دیر میں ہوتا ہے بھی واضح رہے کہ جو بچہ دیر میں ہوتا ہے وہ قانون قدرت کے موافق ٹھیک اور درست ہوتا ہے سوائے دیر کے اور کوئی بات خلاف نہیں ہوتی قاعدہ ہے کہ پہلا درزہ شروع ہونے سے ۱۲ گھنٹے میں اور بعد کا درزہ چھ گھنٹے میں ختم ہوتا ہے اگر کسی عورت کی زیادہ عمر میں مثلاً تینس برس کی عمر میں شادی ہو تو اُس کا پہلا بچہ زیادہ عرصہ میں اور زیادہ تکلیف سے ہوگا اس صورت میں صبر اور استقلال سے کام لیا جاوے اگر مداخلت اور دست اندازی نہ کی جاوے تو صحیح و سلامت بچہ پیدا ہوگا اور مان بھی عافیت سے رہیگی۔ زیادہ عمر کی شادی کا اثر صرف پہلوئشی کے وضع حل پر ہوتا ہے بعد میں ہر بچہ اُسی آسانی بچلت سے ہوتا ہے جیسا کہ کم عمر کی لڑکیوں کے شادی کے بعد ہوتا ہے۔ وضع حل میں دیر ہونا خطرناک نہیں بشرطیکہ بے جا دست اندازی نہ کیجاوے۔ جس عورت کا بچہ دیر میں ہوتا ہے وہ بمقابلہ اُن کے جن کا جلد ہوتا ہے جلد تر تندرست ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قدرت تعجیل اور مداخلت کو پسند نہیں کرتی اسی طرح جن کا پہلا بچہ دیر میں اور تکلیف سے ہوتا ہے اُن کا دوسرا بچہ جلد اور آسانی سے ہوتا ہے۔ پہلوئشی کے وضع حل میں پچھلا درزہ جس سے آنول - اور جھلی وغیرہ خارج ہو جاتی ہیں اگر نہیں ہوتا مگر اس پہلوئشی کے بعد میں جس قدر بچے ہوں گے اُن سب میں پچھلا درزہ جس سے آنول وغیرہ خارج ہوتا ہے ہر ولادت میں زیادہ ہوتا جاوے گا اور پہلا درزہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کم ہوتا جاوے گا اور زیادہ عرصہ تک بھی نہیں رہیگا۔ بعض اوقات درزہ گند اور چھاری اور کبھی تیز چھریکے کانٹے کا سا ہوتا ہے اور گاہے برا چلانی کا سا اور مڑو مڑنے کا سا ہوتا ہے۔

بعض نے درزہ کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے ایک پشت کی طرف دوسرا شکم کی طرف جو در و پشت کی طرف ہوتا ہے اُس میں دائی پشت کو ہاتھ سے

دبائی ہے جس سے زچہ کو آرام معلوم ہوتا ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک نیپیز زچہ کی
بہشت کے مقابل لگا کر پشت کو زور سے سہارا دے تاکہ پیٹھ کو گزند نہ پہونچے۔
شکم کی طرف کے درد کو ہر درد کے وقت دائی شکم کو ہاتھ سے دبائی ہے جس سے درد
کو مدد ملتی ہے اور بچہ جلد پیدا ہو جاتا ہے مگر اس سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ ایک چوڑی
مضبوط پٹی شکم پر لگا کر پشت کی طرف سے دائی اپنے ہاتھوں سے ایکساں کھینچے
اس سے درد زیادہ مدد ملیگی اور بچہ جلد پیدا ہو جائیگا۔ اس طرح پر جب بچہ باہر آتا ہو
اور درد نہایت شدت سے ہوتا ہو تو زچہ اپنے پیروں کو ستون وغیرہ سے اٹا دے
اس سے بھی درد زیادہ مدد ملیگی۔

اصطلاح

وضع حمل سے پہلے چاہئے کہ ہر ایک ضروری سامان زچہ اور بچہ دونوں کا تیار رہے اور وقت سے پہلے دانی حاضر رہے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ شکم صاف ہو ورنہ شروع ہوتے ہی اگر قبض ہو تو ایک خوراک ارندہ کی کاتیل پلا دیں یا تھوڑے سے گرم پانی کا حقنہ کر دیں تاکہ پیٹ صاف ہو جاوے۔ اسی طرح پریشانہ کو خالی کر دیں تاکہ بچہ آسانی سے اور جلد پیدا ہو۔

لباس موسم اور وقت اور موقع کے موافق صاف لباس پہناویں کوئی کپڑا تنگ نہ ہو وقت وضع حل آدمیوں کا مجمع نہ ہو دانی اور ایک یا دو ضروری مددگار کافی ہیں زچہ کو اچھی طرح اطمینان کرادیا جاوے کہ کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے جو لوگ موجود ہوں وہ خاموش رہیں شور و غل نہ ہو۔

جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو دوائی اپنے دامن ہاتھ سے بچہ کے باہر آنے میں مدد دے

مگر جو
 ہوائی
 سے
 میں مثلاً
 نیست
 بدست
 رہیگی
 سی

11

تاکہ اُسانی سے پیدا ہو جاوے۔ وای اپنا بایاں ہاتھ زچہ کے شکم پر رکھ کر دباوے۔ جوں
 جوں بچہ باہر آتا جاوے گا اُسے قدر ہاتھ کے نیچے رحم سکھ کر خالی ہوتا اور چھوٹا ہوتا ہوا
 معلوم ہوگا اور داپنے ہاتھ سے زچہ کے اُس مقام کو جہاں سے بچہ کا سر گذرتا ہے
 سہارا دیوے پس دائی اپنے ہاتھ کو رحم کے ساتھ ساتھ جتھر چھوٹا ہوتا جاوے
 لگائے رکھے زچہ چونکہ بائیں کروٹ پر ہوتی ہے تو رحم سخت گیند کی مانند کولہ کے قریب
 یں رہائیں معلوم ہوگا اُسکو دائی ہاتھ کی انگلیوں سے آہستہ آہستہ ملے تاکہ انول
 نکل آوے۔ رحم کے ملنے سے تین فائدے ہوتے ہیں اول انول کا نکلنا دوسرا رحم
 کا سکڑ کر چھوٹا ہونا تیسرے خون جاری ہونا خطرہ نہ رہتا۔

جب بچہ پیدا ہو جاوے تو دائی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچہ کو دیکھے کہ اُس کی
 گردن میں تال کا پھندا تو نہیں ہے اگر ہو تو اُس کو فوراً نکال دے ورنہ بچہ کا گلا گھٹک
 مرجائے گا اندیشہ ہے اگر اُس کا ہاتھ ٹھرا ہو تو سیدھا کر کے کولہ کی سیدھ میں پیٹ کی
 طرف رکھ دے دوم اُس کے منہ اور ناک کا معاینہ کرے اگر اُس کے منہ اور ناک
 پر چھتی منہ بھی ہو یا اُس کا منہ کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہو یا کوئی رطوبت اُس کے منہ
 یا منہ کے گرد لگی ہو تو رومال سے پونچھ دے ورنہ بچہ کا دم ٹرک جاوے گا آنکھوں کو
 بھی روئی یا ملائم صاف کپڑے سے صاف کر دے یا بورے سک بوش۔

دش گریں فی ادنس سے دہو ڈالے یا ایک حصہ کو روز بوبلی
 ۵۰۰ پانچ ہزار حصہ پانی ملا کر دھوئے

میٹ

قاعدہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے ہی روتا ہے اور اگر کوئی بچہ نہ روے تو اُس کے چوتھوں
 کو ٹھونکیں یا اُسکی پشت کو آہستہ آہستہ تھپکے دیں تاکہ وہ رووے۔ رونے
 سے ہوا پیپڑوں میں جاتی ہے جس سے وہ پھولتے ہیں اور تنفس کی آمد و رفت
 قائم ہو جاتی ہے اگر بچہ بے حس و حرکت مردہ کے مانند پیدا ہو تو اُس کے زیر

اور پشیمانی کے مابین یا چہرہ پر سرد پانی کے چھینٹے اچھی طرح ماریں اگر اس سے گلیا بی نہ ہو تو سر میں کوئی اور سے تسکین یا ٹھونکن تو بچہ پیشیا ہو جاوے گا اور رونے لگے گا اکثر تو اسی سادہ علاج سے بچہ اچھا ہو جاتا ہے جب تک بچہ کے نال میں بنص کی حرکت معلوم ہوتی ہے تب تک اس کو نہ باندھیں بچہ کے ہاتھ پیر سینہ پشت کو گرم ہاتھ سے ماش کریں منہ پر کپڑا نہ ڈالیں اگر اس سے فائدہ نہ ہو اور نال میں بنص کی حرکت محسوس نہ ہو تو نال کو باندھ کر کاٹ دیں اور بچہ کو گرم پانی میں جس کی حرارت ۹۸ درجہ کی ہو گردن تک غوطہ دیں اگر اس سے بھی سانس نہ آوے تو پانی سے نکال لیں اور تدا بیر ذیل عمل میں لاویں۔

بچہ کو چہرہ کے بل اوپر ہاتھ کر روٹ پر لاویں اور پیر بدستور اوپر دھا کر دیں اسی طرح پر آہستہ آہستہ ایک منٹ میں پنڈتہ مرتبہ کریں۔

دوسری ترکیب یہ ہے۔ دائی اپنے بائیں ہاتھ سے بچہ کی ناک کو سونٹے تاکہ ناک میں کوئی چیز نہ ہو اور کھنکھالی ہو تو نال جاوے تب اپنا منہ بچہ کے منہ میں لگا کر آہستہ آہستہ پھونکے تاکہ پیپڑوں میں ہو جاوے اور وہ پھولیں جب پیپڑے پھول جاویں تب دائی اپنے دھنکے ہاتھ سے سینہ دبا کر ہوا کو باہر نکالے اسی طرح ایک منٹ میں پنڈتہ مرتبہ کرے اور کئی منٹ تک برابر کرتی رہے حتیٰ کہ ہوا کی آمد و رفت جاری ہو جاوے اور قدرتی سانس قائم ہو جاوے اس کیلئے سے پہلے بچہ کی سگی کی آواز معلوم ہوتی ہے اور از سر نو زندگی قائم ہو جاتی ہے جب تک سانس نہ آوے اور نال میں بنص کی حرکت محسوس ہوتی ہے نال کو ہرگز نہ باندھے اور بچہ کو ماں کے دودھ اور ان خون سے فائدہ اٹھانے دیں ورنہ زندگی کی امید باقی نہیں رہیگی۔ ایسا بچہ اکثر پورے دنوں سے قریب دو مہینے پہلے پیدا ہوتا ہے۔

مچوں

ابو

ناہے

ماوے

لمے قریب

انول

سراجم

س کی

لھند

ٹ کی

ورناک

کے منہ

وں کو

نر کو بی

ما کو دھو

چوتھوں

ونے

رفت

کے مبین

نال پانڈہ کی ترکیب

جب پتھر پیدا ہو چکے تو ایک ایک فٹ لمبے اور چار یا پانچ تار کے موٹے مضبوط ڈورے جن کے دونوں سروں پر گرہ لگی ہو لیکر اور کند نوک کی قینچی کو جس سے نال کاٹنا منظور ہو دش منٹ پانی میں جوش دیکر تیار رکھیں اب نال کو پچ کی ناف سے قریب دو انچ کے فاصلہ پر دوسری مضبوط گرہ لگا دیں اور دوسرا ڈورہ پہلے ڈورہ سے قریب تین انچ کے فاصلہ سے مثل سابق گرہ لگا دیں ہر دو گرہوں کو خوب دیکھ لیں کہ سرک نہ جاویں ان دونوں گرہوں کے بیچ سے نال کو کاٹ دیں اگر ڈورہ اور قینچی کو جوش نہ دیا جاوے تو ممکن ہے کہ زہر اثر کر جاوے۔

انول کو رحم سے کھینچ کر نکالیں بلکہ اس کو خود نکالنے میں صرف اس قدر کافی ہے کہ دای اپنے واسطے ہاتھ سے شکم کے اوپر سے رحم کو آہستہ آہستہ دباوے تاکہ رحم مسکرا کر انول کو نکال دے اور خون بھی نہ نکلے اگر آدھے گھنٹہ تک انول نہ نکلے اور خون زیادہ نکلنے لگے تو فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر معانیہ کراویں نال کو کھینچ کر نکالنا خطرناک ہے ایسا نہ کریں بلکہ دای نال کے اس سروں کے ساتھ جو رچے سے تعلق رکھتا ہے اپنی انگلیاں بڑھا کر نال کے اس مقام تک پہنچا دے جو انول سے لگا ہے چونکہ کل کام قدرتی طور پر بخوبی ہو رہا تھا انول بھی آسانی سے نکل آوے گا انول کے نکلنے میں ضروری بات یہ ہے کہ انول اور اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوں سب نکل آویں کچھ باقی نہ رہے اس واسطے دای انول کو آہستہ سے پکڑ کر دایا میں تھوڑا سا بل دے یہاں نہ کھینچے اس ترکیب سے جو جہلیاں اس میں لگی ہوں گی مڑوڑی جاوے گی۔ اور کل چیزیں ٹکڑے پارچے اور خون کے بوتھڑے غرض جو چیز نکلنے کے قابل ہوگی نکل آویں گی۔

بچہ کو ایک صاف ملائم کپڑے میں لپیٹ کر علیحدہ رکھ دیں اور رچے کے میلے کھیلے

غلظت کپڑوں وغیرہ کو گرم پانی میں خوب دھو کر سکھالیں اور زچہ کے نیچے کوئی صاف کپڑا بچا کر آرام سے لٹا دیں اور بائیں ہاتھ سے زچہ کے رحم کو آٹھ گھنٹہ تک آہستہ ملیں تاکہ وہ خوب سکڑ جاوے بعد اس کے ایک صاف چوڑی پٹی کپڑے کی شکم پر اس ترکیب سے باندھ دیں کہ نہ زیادہ کسی ہو اور نہ ڈھیلی اور دو تین گھنٹہ تک زچہ کو اسی کروٹ پر رہنے دیں جس کروٹ پر وہ وقت وضع حمل تھی سر کو آرام سے رکھ دیں اگر سیر چار پائی کی پٹی وغیرہ سے اڑے ہوں تو ان کو ہٹا دیں بعد ازاں دو شخص بہت آہستہ سے ایک شانہ دوسرا کو لہ پکڑ کر چپٹ لٹا دیں زچہ خود زور نہ کرے اور بیٹھنے کا قصد کرے ورنہ خون جاری ہو جائیگا خوف ہے۔

بعد وضع حمل عموماً زچہ کو سردی اور لرزہ معلوم ہوتا ہے ایسی حالت میں رضائی یا مکمل اوڑھادیں اور اس کے کنارے چاروں طرف سے دباویں جب سردی اصر لرزہ جاتا رہے تو رضائی اوتار لیں اگر سیر دھوں تو فلائیں کو گرم کر کے پیٹیں یا بوتل میں گرم پانی بھر کر سینکدیں زچہ کے کپڑے صاف رکھیں اس سے زچہ جلد تندرست ہو جاتی ہے چادر اور کپڑوں کو ہمیشہ دھوپ اور ہوا دیدیا کریں زچہ کو صاف لباس اور ہوادار مکان میں رکھیں اور اچھا پانی دیویں تو جلد تندرست ہو جاوے گی۔ اور بخار یا کوئی چھوت کا مرض نہیں ہوگا بعد وضع حمل ایک پیالی چار دینے سے طبیعت نشاں ہو جاتی ہے۔

زچہ کے شکم پر پٹی باندھنا

ڈیڑھ گز لمبا اور شکم کی موافق چوڑا اور مضبوط عفت کپڑا اور دونوں رانوں کی چوڑی میں رکھنے کے واسطے تین چار تہ کپڑے کی گدیاں بنا کر اور رانوں کی جڑ میں رکھ کر اور ایک لمبی گدھی شکم کے اوپر رحم کے مقام پر رکھ کر پٹی کو صفائی کے ساتھ اس طور

مضبوط
نال کاٹنا
ع قریب
رہ سے
بجھ لیں
رضائی کو

ای اپنی
فل کو
نکھنے لگے
بلکہ دائی
ساکے
ہو رہا
کہ انوں
واسطے
اس
کمرے
کے کچھ

برباند ہیں کہ کساؤ بلبا رہے نہ تنگ ہو نہ ڈھیلا اور پٹی مذکور ہر صبح و شام کس و بجا یا کرے
پٹی باندھنے کے فائدے یہ ہیں اول تو زچہ کو آرام معلوم ہوتا ہے اور اگر پیٹ
ڈھیلا ہو گیا ہو تو سمٹ کر اصلی حالت پر آ جاتا ہے بدتمائی جاتی رہتی ہے۔

زچہ خانہ کاماں ہوا اور موسم کے موافق آتش دان گرم رہے زیادہ گرم نہ ہو کھڑکیاں
کھلی رہیں چھ پر ڈال دے جاویں شور و غل نہ ہوتا کہ زچہ سو جاوے زچہ کو زیادہ باتیں نہ
کرنے دیں اور نہ زور سے پونے دیں جب بچہ کو غسل دیکر کپڑے پہنا چکیں اور زچہ
کو بھی آرام سے لیٹا چکیں تو صرف دای زچہ خانہ میں رہے اور لوگوں کی آمد و رفت کم
کرے بجائے سب سے بہتر علاج زچہ کو صرف آرام سے رکھنا ہے اس سے جلد صحت
ہو جاتی ہے سو منے سے قبل پیشاب کرالیں پیشاب کے واسطے ہرگز نہ بٹھاویں
اس سے خون جاری ہو نیکا اندیشہ ہے لیٹے لیٹے کسی برتن میں پیشاب کرالیں
دروزہ کی حالت میں جب دروزہ شدت کا ہوتا ہے اور عرصہ تک رہتا ہے تو
مثانہ پیشاب سے چر ہو جاتا ہے اور زچہ بلا امداد کسی کے خود پیشاب نہیں کر سکتی بعض
اوقات زچہ بار بار پیشاب کرنا کی کوشش کرتی ہے مگر پیشاب نہیں ہوتا اس صورت
میں جب چھریا آٹھ گھنٹہ تک پیشاب نہ ہو تو اسے گھوگھو کر زچہ کو گرم پانی میں نہا کر
یا گرم پانی کا سپارہ دیں اگر تدابیر مذکور بالا سے بارہ گھنٹے تک پیشاب نہ آوے تو
کیڈی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاویں وہ قناطر یعنی سلائی سے پیشاب نکال دیگی۔ اگر
ہوشیار می سے سلائی ڈال کر پیشاب نکالا جاوے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا اکثر
تو ایک ہی بار سلائی سے پیشاب نکالنے کے بعد خود بخود آنے لگتا ہے مگر گاہ گاہ
دو یا تین روز تک اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جب تک کہ مثانہ نکالنے کی پوری
وقت حاصل نہ کرے پیشاب نکالوانے کی ضرورت رہتی ہے۔

کولہ کے رُخ پیدا ہونا

بحساب اوسط ساٹھ ولادت میں ایک بچہ کولہ کے رُخ پیدا ہوتا ہے اس میں مرنے کا عرصہ تک رہتا ہے کیونکہ اس میں بچہ دوسرا ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ وسعت کی ضرورت ہوتی ہے اس واسطے اس میں انتظار کریں استقلال سے ٹھہرے رہیں مداخلت نہ کریں کولہ اور پیریکل آنے کے بعد بچہ پیروں کے رُخ پیدا ہو جاتا ہے۔

توام یعنی دو بچوں کا ایک تھپید ہونا

بحساب اوسط ستروالدات میں ایک توام ہوتا ہے اس ولادت میں پہلے ایک بچہ کا سر نکلتا ہے اور دوسرے بچہ پیر اور کبھی اس کے خلاف یعنی پہلے ایک بچہ کے پیر اور دوسرے کا سر نکلتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے تو رحم کسی قدر چھوٹا ہونا چاہیے مگر بالکل چھوٹا نہیں ہوتا جیسا کہ معمول ہے اس سبب سے دوسرے بچہ کا رحم کے اندر ہونا معلوم ہونا چاہیے کبھی دوسرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے بچہ کا انول نکل آتا اور کبھی نہیں انول نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ممکن ہے کہ دونوں بچوں کا انول ایک ہی ہوشم کے زیریں حصہ کو ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے سے ملکر رحم کی سکرٹ کو تحریک دیتے رہیں پہلا بچہ پیدا ہو نیکی و نل منٹ بعد اکثر دوسرا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی گھنٹوں تک نہیں ہوتا زچہ کو آرام سے لٹائے رکھیں قدرے ٹھنڈی چار یا اراہوٹ بیکار پلا دیں جب دروزہ عود کرے گا تو دوسرا بچہ بھی پیدا جاوے گا۔ غور سے سیلان خون کو دیکھتے رہیں دوسرا بچہ بہ نسبت پہلے کے جلد پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے اور انول نکلنے کے بعد رحم کو سکڑنے کی طرف زیادہ توجہ کریں اور رحم کو ہاتھ سے دبائے اور پکڑتے رہیں جب تک کہ رحم شل سخت گوارے

جایا کرے
بیٹ

لیاں

تین نہ

اور زچہ

تکم

بلد صحت

وہیں

کر لیں

ہا ہے تو

تی بعض

صوت

تک کریں

ے تو

اگر

تا اکثر

ہ گاہ

نکی پوری

ہاتھ کو محسوس ہو۔

پیر کے رخ پیدا ہونا۔ ایسی ولادت فیصدی ایک ہوتی ہے اس میں ایک پیر یا دونوں پیر پہلے نکلتے ہیں۔ یہ ولادت زچہ کو مضر نہیں مگر بچہ کو خطرناک ہے کیونکہ وضع حمل کے دباؤ سے بچہ کے نال کا دوران خون رُک جاتا ہے شروع شروع میں جلدی نہ کرنا چاہئے کیونکہ جس قدر عرصہ تک بچہ کے سر پر ہاتھیں رہیں گے اسی قدر اندر کے ملائم مقامات کشادہ ہونگے اور سر آسانی سے نکلے گا۔ جب کو پہلے نکل آویں تو نال کو دیکھیں اگر نال میں نبض کی حرکت نہ ہو تو دروزہ کی نوبت کے وقت بچہ کے جسم کو استقلال سے نیچے کو کھینچیں تاکہ دونوں شانے نکل آویں اگر بچہ کے پیر کے انگوٹھے ماں کی پشت کی طرف پرے ہوں تو سر نکلنے کے واسطے اچھی علامت ہے اور جب سریں نکل آویں اور پیر کے انگوٹھے سامنے کو پرے ہوں تو دروزہ کے وقت مددگار اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر کو پکڑ کر گھما دے تاکہ شانے نکل آویں۔ شانے نکل آنے کے بعد اگر نال میں نبض کی حرکت محسوس ہو تو بچہ کے زندہ پیدا ہونے کی امید ہے البتہ اگر حرکت مذکور نال میں نہ پائی جاوے تو ہر دروزہ کے وقت شانوں کو کھینچ کر سر نکالنے کی کوشش کریں جب سر نکل آوے تو مددگار نال کی حرکت کا ملاحظہ کرے اگر نال میں نبض کی حرکت پائی جائے تو جب تک بچہ رووے نہیں نال کو نہ باندھیں اگر حرکت محسوس نہ ہو تو وہ علاج کریں جس کا ذکر پہلے اوراق میں گذرا۔ دیکھو صفحہ ۶۷۔

ہاتھ کے رخ پیدا ہونا۔ ہاتھ کہنی اور شانے کے رخ۔ ۲۳ میں ایک ولادت ہوتی ہے ایسی حالت میں لیڈ می ڈاکٹر کا ہونا ضرور ہے تاکہ بچہ کو گھما کر نکال لیوے۔

زچہ کے قبض شکم کا علاج

بعد وضع حمل زچہ کو اکثر قبض ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی علاج ہے کہ زچہ کے مجروح مقامات

خصوصاً گرم راحت ملے اس واسطے زیادہ مداخلت کی حاجت نہیں دوسرے روز کے آخر تک اکثر اجابت ہو جاتی ہے اگر نہ ہو تو صرف ایک پیالی گرم کافی پلا دینے سے اجابت ہو جاوے گی اگر اس سے نہ ہو تو تیسرے دن صبح کو اڑی کاتیل ایک خوراک پلا دیں اگر زچہ اس کو نہ پیوے تو گرم پانی کا حقہ کریں اگر ایک مرتبہ حقہ کرنے سے اجابت نہ ہو تو دو تین گھنٹے بعد دوبارہ کریں اگر اس مرتبہ بھی کار براری نہ ہو تو نسخہ ذیل کا حقہ کریں۔

روغن زیتون ۰۲ - تولہ

کھانے کا نمک ۰۲ - تولہ

چاول کی پیچ گرم ۰۲ - پاؤ

یا صابون کو گرم پانی میں گھول کر تھوڑا سا روغن سلاڈیا روغن نارہیں ملا کر حقہ کریں یا خساندہ سنبلہ چٹانک شربت زنجبیل ۴ ماشہ ملا کر صبح کو پلا دیں اگر اس سے بھی بارہ گھنٹے تک اجابت نہ ہو تو اس خساندہ کا نصف اور پلا دیں اگر اس سے بھی نہ ہو تو بارہ گھنٹے بعد باقی نصف بھی پلا دیں یا انجیر متھے اور سنا کا مچون چھ ماشہ کھلا دیں سوا ان کے اور کوئی تپیر سہل ہرگز نہیں۔

دش پندرہ روز تک زچہ پلنگ پر لیٹی رہے اس کے بعد سات روز تک دوسرے پلنگ یا آرام کرسی پر اس ترکیبے لٹا دیں کہ وہ سر پلنگ یا آرام کرسی پلنگ کے قریب لگے ہو و مدد کا زچہ کے شانے اور کوہچہ پر لگا آہستہ سے بٹھا دیں آرام چوکی پر بھی زچہ اکثر لیٹی ہے کبھی تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاوے رفتہ رفتہ بیٹھنا زیادہ کرتی جاوے اگر ایسا نہ ہو گا تو خون جاری ہونے کا احتمال رہے گا یا رحم نیچے کو جبکہ شکم کو بد نما کر دے گا اور اسقاط حمل کا اندیشہ پیشہ ہوگا اور اولاد کمزور ہوگی۔ یہ باتیں اکثر امرا اور شرفیہ دیکھی جاتی ہیں غریب عورات صبح سے شام تک اپنے خانگی اور پیشے کے کام کاج کیا کرتی ہیں اور ان کو کچھ حشر نہیں

ایک پیپر
کیونکہ
یہ جلدی
راند کے
تو نال
کے جسم
انگوٹھے
درجہ
و گار
علی آنے
الہ
بر سر کا
ل میں
نہ محو

لاوت

مقامات

پہلوٹی کے وضع حمل میں تیسرے وزپستانوں میں قدرے دودھ آجاتا ہے اُن میں
 سختی درم اور پچینی معلوم ہوتی ہے بخار آجاتا ہے کبھی یہ بخار زیادہ ہوتا ہے پستانوں
 ہٹنیاں دبائے سے دودھ کا آجانا معلوم ہوتا ہے اگر دودھ آگیا ہے تو چار چار گھنٹے بعد بچہ کا
 منہ لگاوے اس سے دودھ خوب آجاوے گا جب ابھی طرح دودھ آجاوے تو بچہ کو پہلوان
 ۲۴ گھنٹے کے عرصہ میں صرف تین مرتبہ پلاویں دوسرے روز چار مرتبہ بعد اس کے
 دو دو گھنٹے کے فاصلہ سے پلاتے رہیں بچہ کے منہ میں دودھ دینے سے قبل بورے
 سک ٹوشن (سوہاگہ سرتی پانی ڈھائی تولہ ملا کر عرق بنالیں) کو گرم کر کے ہٹنیوں کو
 اسفنج وغیرہ سے دھو کر ملائم تولیہ سے بونچھ ڈال کریں تاکہ لیسیدار رطوبت اور پسینہ وغیرہ
 جو کچھ ہوصاف ہو جاوے اس کے بعد بچہ کا منہ لگا دیں اگر بچہ دودھ نہ چوسے تو ذرا سا
 شہد لگا دیں اگر پستاناں بہرے ہوئے سخت گانٹھ دار ہوں اور اون میں درد بھی ہوتا
 ہو تو روغن زیتون کو گرم کر کے چار چار گھنٹے بعد آہستہ آہستہ مالش کریں اور ایک
 ملائم ہٹشی رومال ہر پستان کے نیچے سے اوپر لٹکا کر گردن کے پیچھے گڈی پر باندھ دیں تاکہ
 ہر دو پستان سہارا پاویں ہٹکیں نہیں آرام سے رہیں اس ترکیب سے دو تین روز
 میں عرق اور درد جاتا رہیگا اور بچہ آرام سے دودھ پیے گا۔ پہلوٹی کے بعد جب اور بچے ہو
 ہیں تو اُن میں یہ تکلیف نہیں ہوتی اور نہ علاج کی ضرورت پڑتی ہے صرف استفادہ
 چاہئے کہ جب دودھ آجاوے تو بچہ کو مناسب وقفہ کے ساتھ دونوں پستانوں کو دودھ
 باری باری سے پلا دیں۔ نوزائیدہ بچہ غسل اور کپڑے پہننے کے بعد سو جاتا ہے اور
 گھنٹوں تک سوتا رہتا ہے پس اُس کو سونے دیں دودھ پلانے کے واسطے نہ جگا دیں
 جب دودھ پستانوں میں آجاوے گا تو بچہ خود بیدار ہو جاوے گا اور دودھ کے واسطے
 رووے گا بچہ کو خواہ مخواہ جگانا اور اُس کے منہ میں دودھ ٹھونسنماں اور بچہ دونوں
 کو تکلیف دیتا ہے مان کو چاہئے کہ بچہ کو مقررہ وقت پر دودھ پلاوے اکثر عورتیں ایسی

کام کاج کرتی ہیں اور ان کو کچھ ضرر نہیں ہوتا۔

غذا بعد وضع حمل

پہلے روز صرف ہلکی غذا جیسے ارا روٹ اور دودھ یا صرف دودھ یا چار یا پانچ روٹی اور روٹ دیں۔ زیادہ نہ دیں صرف ایک پیالہ ایک مرتبہ میں کافی ہے جب تک دودھ اچھی طرح نہ اترے اور دودھ اترنے کا زمانہ نہ گزر جاوے تب تک زچہ کو ہلکا اور تپلا کھانا دیں تین چار روز کے بعد اچھی مگر ملائم ہلکی غذا دیں پانچ یا چھ روز کے بعد معمولی غذا دینے لگیں زچہ کی غذا مثل اور مرغیوں کے جیسا مناسب ہو دیں قوی اور مضبوط عورتوں کو ان کے موافق نازک مزاج کمزور عورتوں کو ان کے موافق دیں۔ پلانے کے واسطے پہلے ہفتہ میں آش جو دودھ قدر سے مک یا شکر ڈال کر پلا دیں گرم موسم میں ہلکی چادر سے شکر اور ملائی ملا کر دیں اگر قبض ہو تو وقتاً فوقتاً بجائے چار کے کافی پلا دیں۔

دودھ پلانا

اگر ماں تندرست اور قابل دودھ پلانے کے ہو اور پستانوں میں دودھ بھی اچھا اگر کافی ہو تو ضرور ہے کہ خود ماں ہی دودھ پلاوے اتنا سے دودھ نہ پلاوے دودھ پلانے سے ماں اور بچہ دونوں میں زیادہ محبت ہو جاتی ہے اتنا سے دودھ پلوانے میں محبت کم ہوتی ہے اور بچہ نوکروں کی نگرانی میں پرورش پاتا ہے ایسے بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بتقابلہ ماں کے دودھ پلانے کے زیادہ مرتے ہیں ماں کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ کی حرکات و سکنات سے ہر وقت زندہ دل اور خوش رہتی ہے غم غلط ہوتا رہتا ہے جلد حاملہ نہیں ہوتی جلد جلد وضع حمل سے عورت کمزور ہو جاتی ہے دودھ پلانے سے استعدا کمزور نہیں ہوتی بلکہ قوت اور مضبوطی آ جاتی ہے۔

ان میں
پستانوں کی
مدد چھ کا
کو پہلے دن
س کے
برے
یوں کو
پسینہ وغیرہ
ذرا سا
رو بھی ہوتا
ادرا ایک
دیں تاکہ
دو تین روز
اور بچے ہو
صرف استفادہ
نوں کا دودھ
اتنا ہے او
نہ جگاہیں
کے واسطے
ورچہ دونوں
تیں ایسی

ہوتی ہیں کیچہ جب روتا ہے تو اس کے منہ میں دودھ دیدیتی ہیں خواہ کیچہ زیادہ دودھ پی لیتے
 یا پیٹ میں درد ہونے یا پیٹ پہنچانے کے سبب روتا ہو ہر وقت جب کیچہ رووے منہ
 میں دودھ دیدینا اور کیچہ دونوں کو مضربے ماں کو چاہئے کہ ایک ٹہنیہ کی عمر تک دو
 دو گھنٹہ بعد دودھ پلاوے بعد اسکے اس وقفہ کو تدریج بڑھا کر چار چار گھنٹے بعد پلانے
 لگے اس ترکیب سے کیچہ دودھ کا وقت پہچان نے لگے گا اور اپنے وقت پر دودھ کی تلاش
 کرے گا اور ہر وقت خوش رہیگا ماں رات میں کیچہ کو بار بار دودھ پلاتی ہے جس سے
 ماں اور کیچہ دونوں کی نیند خراب ہوتی ہے اور کیچہ کی عادت بگڑ جاتی ہے جس کا درست
 ہونا مشکل ہو جاتا ہے ماں کے پستانوں اور کیچہ کے منہ میں خراش ہو کر زخم چڑھ جاتے
 ہیں اور گاہے پستان پکھلتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوٹے کیچہ کو ماں دودھ پلاتے
 پلائے سو جاتی ہے اور کیچہ کی ناک اور منہ پستان میں یا کپڑے میں گھس جاتے ہیں
 اور کیچہ دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔

دودھ پلانے کی غذا

دودھ پلانے والی کی غذا ہلکی اور مقوی ہونی چاہئے اور انتہا کے موافق شکم سیر ہو کر
 کہاوے اصرار کر کے زیادہ کھلانا یا بلا خواہش کہا لینے سے بجائے فائدہ کے نقصان
 ہوتا ہے معمولی غذا جیسے شوربہ چپاتی گھی کھچڑی دال چاول دودھ ولیہ ترکاریوں میں
 کہیا لو کی شلغم تریاں آنوساگ پالک میتھی گائے کا دودھ خاص کر دیا جاوے اس سے
 دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے بعض کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی کو پیڑ
 غذا کی حاجت نہیں یہ خیال غلط ہے غذا کا اثر دودھ پر ضرور ہوتا ہے مثلاً اگر ماں شلغم
 لیوے تو کیچہ کو ماں سے زیادہ دست آویگے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر گائے کو شلغم
 کہلائے جاوے تو اس کے دودھ میں شلغم کا ذائقہ اور بو پائی جاوے گی۔ اسی طرح

ماں کا دودھ اوسکے بچے کے واسطے نہایت مفید ہوتا ہے مگر جب ماں ثقیل مریض اور
 دیرمقام غذا کھاوے تو اُس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے بخلاف اس کے کہ دودھ پلائی کا
 دودھ جو کبھی طرح ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر شادہ ملائم تر ہو ہضم اور غذا
 بخش غذا کھاوے تو بچہ تندرست رہتا ہے اکثر بیمار نہیں ہوتا اور دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے
 کبھی دودھ پلائی کو تشنگی ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو تو نصف دودھ اور نصف پانی ملا کر یا
 آتش جو اور دودھ ملا کر یا گرم پانی پلا دیں یا روزانہ تھوڑی دیر کے واسطے کسی
 ہو اور جگہ یا خانہ بان غیس چیل قدمی کرین چیل قدمی کے بعد فوراً دودھ نہ پلاو بلکہ
 کچھ دیر ٹھہر کر دودھ پلاویں ۔

مزاج کا اثر دودھ پر غصہ کرینے دودھ خراب ہو جاتا ہے اور پٹھیل ہو جاتا ہے اچانک
 کی خوشی یا دفعتاً کے رخ سے بچے کو دست یا پھیش ہو جاتی ہے خوش مزاج ملائم طبیعت
 کی ماں کا بچہ خوش مزاج نیک طبیعت ہوتا ہے اور بیمار کم ہوتا ہے اسی طرح یہ مزاج
 ماں کے دودھ سے بچہ بد مزاج اور پٹھڑا ہو جاتا ہے دودھ پلانے والی کاروبار کرتی رہے سہ
 ہلکی غذا کھاوے ہو اور مکان میں چلے پہرے تو طبیعت بنشاش اور تندرست رہیگی ۔
 امیرزادیاں اکثر کام نہیں کرتیں عیش و عشرت میں اوقات بسر کرتی ہیں پلنگ یا آرام
 چوکی پر سست پڑی رہتی ہیں انکی صحت ہمیشہ خراب اور ناقص رہتی ہے عوارض
 بھی اکثر لاحق ہوتے رہتے ہیں ۔ جیسے مضمی لاغری کمزوری باؤ گولہ وغیرہ اور ہمیشہ
 طبیب کی محتاج رہتی ہیں اُن کے بچے کمزور پٹھے اور سست ہوتے ہیں اور اکثر بیمار رہتے
 ہیں دودھ اکثر تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا ہے تو کم اور خراب ۔

غریب عورات صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتی رہتی ہیں اور سادہ معمولی
 غذا کھاتی ہیں وہ بھی کم مٹی سے اُن کے دودھ بکثرت اور اچھا ہوتا ہے اور اُن کی
 اولاد توانا اور تندرست رہتی ہے اچھی دودھ پلائی وہ ہے جو محنت اور مشقت

پانی لینے
 سے منہ
 دودھ
 پلاتے
 بلاش
 سے
 درست
 چاتے
 پلاتے
 نے ہیں

سیر جو کر
 افسان
 بوں میں
 سے
 الی کو پیر
 رماں پہل
 کے کو شلم
 ناطر چہر

بہٹیوں کا زخم یا خراش

ہر وقت بچہ کو دودھ چوسانے سے بہٹیوں میں خراش اور زخم ہو جاتا ہے اور ورم بھی آجاتا ہے جب ایسا ہو تو سفوف سوہاگہ اور نشا پستہ ملا کر بہٹی پر چڑھیں یا سفوف گوند بھول ^{مہاشہ} یا تور ^{ایتونہ} بہشکر کا بادیک سفوف دھرتی ملا کر لگا دیں چونکہ انہیں کوئی تیز چیز ضرر رساں نہیں ہے اس واسطے دودھ پلانے کے وقت دھونے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر بچے کے منہ میں خراش وغیرہ ہو گا تو اسکو بھی فائدہ ہو گا اگر مذکورہ بالا ادویہ سے فائدہ نہ ہو تو ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد برانڈی اور گلے سیریں برابر ملا کر لپیپ کر دیں یا تیلی کی برابر ملائم کپڑے کو گول کاٹ کر عرق مذکور میں تر کر کے لگا دیں جب تک صحت نہ ہو ایسا ہی کرتے رہیں دودھ پلاتے وقت گرم پانی سے صاف کر دیا کریں صرف گلے سیریں ہی لگانے سے بھی اکثر فائدہ ہو جاتا ہے برانڈی کی چنداں ضرورت نہیں۔

بعض اوقات بہٹیاں بہشکر دراریں پڑ جاتی ہیں میرا لیں اکثر اس مقام پر ہوتی ہیں جہاں بہٹی پستان سے ملتی ہے مگر اور مقام پر بھی ہو سکتی ہیں اس سے گاہے سوزش بھی ہو جاتی ہے اور کبھی پستان میں پھوٹا ہو جاتا ہے دودھ پلانے کے بعد بچے کے منہ سے بہٹی نکال لینا چاہئے اندر رہنے سے دودھ جھجاتا ہے اور بہٹی پہٹ جاتی ہے اگر بچہ کا منہ آگیا ہو تو ماں کے بہٹی میں بھی زخم ہو جاتے ہیں اس صورت میں ماں اور بچہ دونوں کا علاج ہونا چاہئے اگر بہٹی میں صرف درد ہو دراز نہ پڑی ہو تو دوسیلین لگانے سے آرام ہو جاتا ہے بہٹی کی دراریں پڑ جانے کا بہتر علاج یہ ہے کہ صرف گلے سیریں یا گلے سیریں اور برانڈی کا لپیپ کر دیا کریں اور اگر بہٹیاں چھوٹی ہو گئی ہوں اور اندر کو دیکھی ہوں تو رٹڑ کی نلی سے جسکا ذکر اوپر ہوا دودھ پلا دیں۔

بعض اوقات دودھ پلانے کے بعد بچہ انورٹس دودھ ٹپکا کرتا ہے اور ماں کے کپڑے تر اور

کرتی رہے ہو ایسے چلے پھرے معمولی سادہ غذا کھاوے نیک مزاج ہو اُس کے بچے ہمیشہ خوش مزاج تندرست اور توانا رہتے ہیں دودھ پلانے کی حالت میں اگر عورت حاملہ ہو جاوے تو غالباً حاملہ بھی ہو جاوے گی اگر حالضہ نہ ہو تو اکثر حاملہ بھی ہوتی اگر دودھ پلائی حاملہ ہو جاوے تو بچے کا دودھ ٹھہرا دینا چاہئے خواہ ابھی دودھ پھرانی کا وقت بھی نہ آیا ہو ایسی عورتوں کی صحت بہ سبب زیادہ بچے ہونے کے اکثر بگڑ جاتی ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ حاملہ ہونے سے دودھ نہیں بگڑتا بلکہ زیادہ شیریں اور خالص ہو جاتا ہے یہ بات غلط بلکہ کم شیریں اور غیر خالص ہو جاتا ہے۔

دودھ پلائی کے امراض

تنگ محرم سے پستانوں کی بہشیاں دجاتی ہے اُن میں ورم اور زخم ہو جاتے ہیں اور ماں بچہ کو دودھ نہیں پلا سکتی مجبور دوسرے کا دودھ پلا تا پڑتا ہے تنگ محرم سے پستان چھوئے ہو جاتے ہیں اور اُن کے اندر کی گلیاں جن سے دودھ پیدا ہوتا ہے جذبے جاتی ہیں اور بہشیاں شکر گر اندر کو دجاتی ہیں اور دودھ پلانے کے قابل نہیں رہتیں جب ایسا ہو اور ماں بچہ کو دودھ نہ پلا سکے تو بڑی مصنوعی بہشٹی (ربر کی نلی) اصلی بہشٹی پر لگا کر دودھ پلاوے اس طرح بچہ آسانی سے دودھ پی لیوے گا۔ اس ترکیب سے چند روز بعد بہشیاں خود بخود بڑھ کر دودھ پلانے کے قابل ہو جاویں گی پھر بڑی نلی کی ضرورت نہیں رہے گی یاد رکھیں کہ روئی کے گالہ کا گول ٹکڑا لیکر اُس کے بیچ میں ایک ایسا سوراخ کریں کہ جس میں بہشٹی آ جاوے اُس کو گٹے سیریں میں تر کر کے اس طور سے لگا دیں کہ بہشٹی سوراخ کے اندر آ جاوے اس ترکیب سے چند روز میں بہشٹی بڑھ کر اُبھر آوے گی اور بچہ آسانی سے دودھ پی سکے گا جو عورتیں محرم نہیں بہتیں یا ڈھیلی بہشٹیاں ہیں اُن کے پستانیں اور بہشیاں بڑی اور اُبھر ہوئی ہوتی ہیں اُن کو یہ شکایت کبھی نہیں ہوتی۔

ن آجاتا
بول
نہ
ہیں
ہر مرتبہ
ر ملائم
رتے
لگانے

ماں بہشٹی
ہو جاتی
بہشٹی
بچہ کو
بچہ دونوں
کافے

سیریں
اور اندر

تے تر اور

خراب ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں رونی کے گالہ کا کٹڑا پستانوں پر لگا دیں تاکہ دودھ جذب ہوتا رہے اور کپڑے خراب نہ ہوں۔

دودھ پلانے کے وقت پستانوں کو دبا کر دیکھ لیا کریں کہ آیا دودھ ہے یا نہیں اگر نہ ہو تو بچہ کو بار بار پستانوں سے لگا دیں تاکہ دودھ اتر آوے۔

اگر پستانوں میں دودھ بہا رہا ہو اور بچہ نہ پیوے تو لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کرا دیں تاکہ معلوم ہو کہ بچہ بیمار تو نہیں ہے اگر دودھ بہا رہا ہو اور بچہ نہ پیتا ہو اور ماں کو اس سے تکلیف ہو تو ہاتھ کو گرم کر کے ہتھیلی پر روغن زیتون یا میٹھا تیل ڈال کر پستانوں کی جڑ کی طرف سے نوک کی طرف کو آہستہ آہستہ مالش کریں جب مالش کر چکیں تو ہر ایک پستان کو ایک لمبے ملائم ریشی رومال کو کئی لمبی تہ کر کے پستان کے نیچے پیچھے کو شانہ پر لیج کر پشت گردن پر گرہ لگا دیں

پستانوں کا پچبانا

اسباب - پستانوں کا سیلا رکنا۔ بہشوں میں خراش یا زخم ہونا تنگ محرم پہنا عیش و عشرت میں رہنا بہشوں کا چھوٹا اور اندر کو دبا ہونا۔ چوٹ لگنا۔ سردی لگنا۔ خصوصاً دودھ پلانے کے وقت دفعتاً دودھ چھڑا دینا۔ پستانوں میں دودھ بکثرت ہو جانا جیسا کہ بچہ کے مرجانے سے اکثر ہوتا ہے۔ پستانوں کی بہشوں میں خراش ہو جانا بھری پستانوں کا لشکار ہنا کمزوری کا ہونا بہشوں کا چھوٹا ہونا پہلو تھپی کے وضع حمل کے بعد اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے۔

یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اول قسم میں پستان کی بالائی سطح کی ساخت ماؤف ہوتی ہے ماں بچہ کو دودھ پلاتی رہتی ہے کیونکہ دودھ پیدا ہونے کا مقام بیماری سے محفوظ رہتا ہے اور بار بار گرم تولیوں لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔

قسم و کوم میں پستان کی گہری ساخت بھی مبتلا مرض ہو جاتی ہے جس پستان میں یہ مرض ہو جاتا ہے اُس سے دودھ پلانا نہ چاہئے البتہ دوسرے پستان سے جس میں یہ مرض نہیں ہے دودھ پلاتی رہے۔

علامات سردی اور لرزہ سے بخار آ جاتا ہے اور جب قدر مرض سخت ہوتا ہے اسی قدر عرصہ تک لرزہ بخار رہتا ہے لرزہ کے ساتھ پستان میں ٹیس اور نشتر چھوٹے کا سادہ رہتا ہے اور پستان کے کسی خاص مقام پر سختی۔ ورم اور مرضی اور گرمی معلوم ہوتی ہے دودھ یا تو کم ہو جاتا ہے یا بالکل خشک ہو جاتا ہے بچہ کا منہ لگنے سے سخت درد اور تکلیف ہوتی ہے مریضہ کا جسم کبھی گرم اور کبھی سرد معلوم ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا رگوں میں سرد پانی بہتا ہے۔ ہو کہ جانی رہتی ہے تشنگی زیادہ ہو جاتی ہے مریضہ کمزور ہو جاتی ہے اور گاہ گاہ ہینون تک مبتلا مرض ہوتی ہے کبھی پستانوں میں بہت سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔

علاج پوست کے گرم جو شانہ سے سینک کریں گاہ گاہ بچہ کو دودھ پلا کر یا دودھ کیچنے کے اکہ سے پستانوں کو کسیدہ خالی کر لیا کریں پستانوں میں زیادہ دودھ نہ بہرنے دیں۔ روغن زیتون یا روغن سلاڈیا سوپ لینیت سے پستانوں کی جڑ سے ہٹنی کی طرف چار چار گھنٹے بعد مالش کریں پستانوں کو سہارا دیے کی غرض سے ایک رومال میں سوراخ کر کے ٹہنی کو اُس میں ڈال کر رومال کو پشت کی طرف سے لپکا کر مخالف شانہ کے اوپر باندھ دیں مریضہ اکثر اوقات لیٹی رہے تاکہ پستان لٹکنے نہ پیاوے۔ پانچ گریں کوئین دن میں تین مرتبہ کہلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے قبض ہو تو ایک خوراک ازبڈی کا تیل پلا دیں بخار کم کرنے کے واسطے صفحہ دو پلا دیں ہٹنی کے گرد دو تین انچ کے صلیب تک لینیت آف بلاڈونا کی مالش کریں اس سے دودھ کی پیدائش کم ہو جاوے گی۔ اگر پستان تنے ہوئے سخت اور چپکتے ہوں اور درد زیادہ ہو اور سوزش کے آثار

پر لگا دیں تاکہ

یا نہیں اگر نہ ہو

تاکہ معلوم ہو کہ

تایف ہو تو ہاتھ

لی طرف سے نو

پستان کو ایک

شانہ پر لپکا کر

ہونا تنگ محرم

سردی لگند

ہ بکثرت ہو جانا

ہو جانا بہری

ضع حمل کے بعد

ف ہوتی ہے

بی سے محفوظ

پاک جاویں تو ایک دو روز تک لینینٹ مذکور کی مالش کرنے سے سوزش کا ہونا موقوف ہو جاوے گا۔ اور مواد پڑنے نہ پاوے گا چونکہ بلاؤ و ناسخت زہر ہے اس واسطے دودھ پلاتے وقت خوب دھوڈا لائیں اس کے استعمال سے اگر مرضہ کے حلق میں خستگی معلوم ہو یا بصارت میں فرق آجاوے تو اس کا استعمال فوراً موقوف کر دیں اس مرض میں شروع ہی سے لیڈی ڈاکٹر کا علاج کریں تاکہ علاوہ جلد صحت ہونے کے پستانوں میں دودھ بھی قائم رہے بعض اوقات پوری کوشش بھی جیسا کہ پہلے تھا دودھ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ کبھی کبھی ہمیشہ کیواسطے وہ پستان بیکار ہو جاتی ہے جو عورتیں محرم نہیں بنتیں یا ڈھیلی بنتیں ہیں اور پستانوں کو صاف رکھتیں ہیں اور کاروبار کرتی رہتی ہیں ہو ایسی جلتی پرتی رہتی ہیں اون کو یہ مرض نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے جو عورتیں اپنی زندگی عیش و عشرت میں صرف کرتیں محرم تنگ بنتیں ہیں وضع داری پر مرتی ہیں کام کاج نہیں کرتیں پستانوں کی صفائی کا چنداں خیال نہیں کرتیں ان کے پستان اور بٹنیاں ٹرکین ہی سے چوٹی خراب اور کمزور ہوتی ہیں اور وہ خود بھی کمزور ہوتی ہیں بٹنیاں چوٹی اور اندر کو دبی ہوئی پستان کی سطح کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں ایسی عورتوں کو پہلوٹھی کے وضع حل کے اول ہی چھینے میں جبکہ اپنے پستان اور بچے کے منہ کو صاف نہیں رکھتیں جاندار مادہ بٹنیوں کی نالیوں کی راہ پستان کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور پستان پکجائے ہیں یہ طرح بٹنیوں کے زخم سے بھی جاندار مادہ اندر داخل ہو کر پہوڑا پیدا کرتا ہے ایسے پستان دودھ پلانے کے قابل نہیں رہتے۔

پستانوں کا پہوڑا

اگر سوزش پستان کو صحت نہ ہو اور مواد پڑ جاوے تو پستان میں پہوڑا ہو جاتا ہے

علامات پستان میں شیش کا درد ہوتا ہے لڑہ ہو کر بخار آجاتا ہے مواد پڑنے کی جگہ پھول جاتی ہے اُس مقام کی جلد پہلے سرخ اور پھر سفید ہو کر ابھرتی ہے اگر شکاف دیکر مواد خارج نہ کر دیا جاوے تو وہ جگہ زیادہ ابھرتی ہے اور آخر کو پھوٹ کر مواد خارج ہو جاتا ہے۔

علاج پس جب مواد پڑ جاوے اور مواد کا مقام معلوم ہو تو ہٹانی کی طرف سے جڑ کی طرف کو نشتر سے لمبا شکاف کر دیں تاکہ مواد کل جاوے گولائی میں شکاف نہ دیں۔ اگر مواد پڑتے ہی نشتر لگا دیا جاوے تو مریضہ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی ورنہ مواد اندر کو رجوع ہو کر پستان کی گہری ساخت تک چلا جاوے گا اور تمام پستان خراب ہو جاوے گی اور ناسور ہو جاوے گا۔ اور سخت عمل جراحی برداشت کرنی پڑے گی اگر نشتر نہ ملے تو تیز قلم تراش سے شکاف کر دیں، نراں بعد بڑا سا گرم گرم پولٹس باندھیں اور جب تک مواد آتا رہے برابر پولٹس باندھ جائیں اور بعد میں عام پھوٹے کے موافق علاج کریں۔ چونکہ یہ مرض کمزور عورتوں کو ہوتا ہے اس واسطے مقوی غذا اور زود ہضم بھی طرح کھلا دیں اور مقوی ادویہ جیسے مرکبات فولاد اور کونین میں دینا

دودھ پلانے کے واسطے قبض کشا ادویہ تبدیلہ

دودھ پلانے والی عورت کو تیز مسہل ہرگز نہ دیں اس سے ماں اور بچہ دونوں کو نقصان ہوتا ہے البتہ اگر ضرورت ہو تو ایک خوراک ولایتی اینڈی کا تیل یا کسکرو (Castor Oil) دیویں حقنہ سب سے بہتر قبض کشا دوا ہے اس سے نہ بچہ کو ضرر ہوتا ہے نہ ماں کو اور نہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے خالص گرم پانی یا چاول کی پیچ یا نمک اور روغن شیش یا گلے سیریں اور گرم پانی ان میں سے کسی چیز کا حقنہ کرنے سے رفع قبض ہو جاتا ہے رفع قبض کے واسطے صرف حقنہ بھی کافی ہے دوا کی ضرورت نہیں بار بار

پس

سط

میں

دیں

ونے

پہلے

نہ

میں

تا

بیتین

نیاں

نہیں

ط کے

کے

نہیں

ہے

ل ہو کر

بات ہے

ملینیات دو آئیں پلانے سے دو کی عادت ہو جاتی ہے اور پہر بلا دو اجابت نہیں ہوتی اگر دودھ پلانے والی کو قبض دیکھی ہو تو باریک آٹے کی روٹی کھانا چوڑے موٹے آٹے کی روٹی کھاوے یا ایک حصہ موٹے آٹے کو تین حصہ باریک آٹے میں ملا کر پکاویں اور چار میں بجائے شکریہ مصری خام شکر یا شہد ملا کر بلا دیں۔ اہلی منتقے آلو بخارہ الوچہ تہل ہبلا کر سر صج پندرہ یا بیس دانے کھلا دیا کریں یا جوش دیکر قدرے خام شکر یا شہد ملا کر بلا دیا کریں یا ایک گلاس سرو پانی نہار منہ بلا دیا کریں ان سب چیزوں سے قبض رفع ہو جاتا ہے بچوں کو بھی سرو پانی پلانے سے قبض نہیں ہونے پاتا علاوہ تدابیر مذکورہ بالا کے غذا میں تغیر تبدیل کرتے رہنا سب ترکاریوں کا استعمال کرنا ہوا ہوا مکان یا پائیں یا غنیمت وقت مقررہ پر چل قدمی کرنا کاروبار کرتے رہنا شب کو سوتے وقت سرو پانی کی گدی شکم پر باندھ کر چلہ یا پانچ گھنٹے تک بند رہنے دینا اجابت کے واسطے دیر تک پائخانہ میں بیٹھ رہنے سے ہرگز قبض نہیں ہوگا۔

دودھ چھڑانا

دودھ کا چھڑانا ماں اور بچہ دونوں کی حالت پر منحصر ہے اگر بچہ تندرست اور قوی ہو تو ایک سال کی عمر میں دودھ چھڑا سکتے ہیں اور اگر کمزور ہو یا اسکی صحت اچھی نہ ہو تو جب تک کم از کم بارہ دانت نہ نکل آویں دودھ نہ چھڑا دیں اگر دانت دیر میں نکلیں تو دودھ بھی دیر میں چھڑایا جاوے۔ اگر بچہ کے دانت میں خراش ہو۔ یا موسم سرما ہو یا جس موسم میں مرض اسہال زیادہ ہوتا ہے یا مرض ہیضہ پھیلا ہوا ان صورتوں میں دودھ نہ چھڑا دیں۔ جب دودھ چھڑانا منظور ہو تو دفعتاً نہ چھڑا دیں ورنہ ہاضمہ بگڑ جاوے گا بتدریج دودھ پلانا کم کرتے جاویں اور دوسری غذا بڑھاتے جاویں یہاں تک کہ بچہ غذا کھانے لگے اس طرح ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔

دودہ چڑانے کی واسطہ ذرا سا ایلو پانی میں گھس کر بھنی پر لگا دیں ایک یا دو لیپ سے
بچہ دودہ چھوڑ دے گا۔ یا قس الطین کا بار ایک سفوف چھڑکیں یا پانی میں جوش دیکر
اس کا عرق لگا دیں اس سے بھی بچہ دودہ چھوڑ دیتا ہے ان دواؤں میں سے اگر
کوئی دوا بچہ کے منہ میں کسی قدر چلی بھی جاوے تو مضائقہ نہیں۔

پستانوں سے دودہ خشک کر نیکی ترکیب

ہر پستان کے واسطے ایک ایک رومال کو کئی تہ دیکر پستانوں کے نیچے سے
پیچھے مخالف شانہ پر لیجا کر پشت گردن پر گرہ لگا دیں اور ایک چوڑے کپڑے کی
پٹی سے پستانوں کو سینہ پر دبا کر باندھ دیں اس ترکیب سے دو تین روز میں
دودہ خشک ہو جاوے گا اس سے اگر کامیابی نہ ہو تو بلا ڈونا پلاسٹر کا چوڑا ٹکڑا
جس کے پنج میں بھنی کے برابر کوٹ کر لگا گیا ہو اس میں بھنی داخل کر کے ایک ایک
ٹکڑا دونوں پستانوں پر لگا دیں اس سے بھی دودہ خشک ہو جاوے گا اگر
پانچ یا چھ روز تک دودہ خشک نہ ہو اور پستانیں دودہ سے بہری ہوں اور مال
کو تکلیف ہوتی ہو تو بلا ڈونا پلاسٹر اوتا کر روغن زیتون کو گرم کر کے چار چار
گھنٹے بعد آہستہ آہستہ ہاتھ سے مالش کریں ملنے والی دوسرے ہاتھ سے
پستان کو سہارا دیتی رہے دودہ چڑانے کے بعد پستانوں کو نہ کنبھیں کہنچے
سے دودہ پستانوں میں بہر آتا ہے۔ دودہ چڑانے کے بعد ہلکی غذا کھانا چاہئے اور
گاہ گاہ ہلکا مسہل بھی لیتی رہے۔ بعض اوقات دودہ بخور کر نکال دیتے ہیں۔

اسباب جن سے مجبوراً دودہ چڑانا پڑتا ہے

دودہ پلائی کو کبھی ایسی علامات لاحق ہوتی ہیں کہ مجبوراً دودہ چڑانا پڑتا ہے جنکی

بہت بھنی
روے موٹے
سین میں ملا کر
قے آلو بخارہ
سے خام
بچہ چھوڑ
نے پانا علما
کرنا ہو مار
ب کو سوتے
یضا اجابت

بی ہو تو
اچھی نہ ہو
بر میں بھلیں
اموم سرما
درتوں میں
بکڑ جاویگا
س تک

تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ کل علامات ایسی ہیں جنہیں بائیں جانب مگر جب دو چار ٹری علامات دیکھی جاویں تو دودھ چھڑا تالاڑی ہو جاتا ہے۔

علامات کانوں میں گانے کی سی آواز آنا۔ نظریں چکاچوندہ ہو جانا آنکھوں کے ڈھیلوں میں درد ہونا سر میں دھک دھک ہونا باؤ گولہ کی علامات ہونی۔ نازک مزاجی کپکپی بخشی۔ لاغری۔ اختلاج قلب ضعف زیادہ معلوم ہونا اشتہا کا نہ ہونا۔ بدھمی قبض۔ دل بچھا جانا۔ بائیں پہلو میں درد ہونا پستان میں بچے کا منہ لگانے سے درمیان زیادتی ہوتی ہے۔ چہرہ پیکا۔ کوتاہ دمی ٹخنوں میں ورم آ جاتا ہے۔ اگر علامات مذکورہ بالا ملاحظہ کرنے کے بعد بھی غفلت کیجاوے اور دودھ نہ چھڑایا جاوے تو ماں اور بچہ دونوں کو سخت نقصان پیش آتا ہے ماں کو اکثر مرض سب اور بچہ کو سوسکے کا عارضہ ہو جاتا ہے۔

اگر دودھ پلائی کا دودھ دفعتاً کم ہو جاوے تو معلوم ہوگا کہ حاملہ ہو گئے اس وقت بچہ کا دودھ چھڑا دینا چاہئے کیونکہ اس حالت میں دودھ کی غذائیت اور مقدار دونوں کم ہو جاتی ہیں اگر ایسا دودھ بچہ پیتا رہیگا تو کمزور ہو جاوے گا اور بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔

اگر دودھ پلانے والی عورت تندرست اور توانا ہو اور مذکورہ بالا علامات سے کوئی بھی علامت پائی نہ جاوے مگر اس کی بہنیاں اور پستانیں چھوٹی اور خراب ہوں اور دودھ بھی کم ہو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو ایسی عورت بچہ کو دودھ نہ پلاوے ورنہ پستانوں میں سخت درد ہو کر ورم اور زخم ہو جاوے گی۔

بعض اوقات بہنیوں کا زخم باوجود اچھا علاج ہو نیکی بھی صحت یاب نہیں ہوتا ایسا زخم اکثر کمزور نازک مزاج عورتوں میں دیکھا جاتا ہے ایسی عورتوں کو فوراً دودھ چھڑا دینا چاہئے ورنہ ممکن ہے کہ پستان پکجاویں اور مریضہ کی صحت

بگڑے

رسل

یا بہن

لیڈ

کراویہ

کبھو

تین

رحم

ٹوٹ

ہرقہ

عل

رکھ

خام

دو

یا کو

جا

اس

غش

ما

بگڑ چاؤ سے اور زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے اگر ماں کی طبیعت کا میلان
رسل اور وق کی طرف ہو اور منہ سے خون آنا ہو (نفس الدم) یا اختلاج قلب ہو
یا بہت کمزور اور نازک مزاج ہو ان میں سے کوئی کبھی علامت پایا جائے تو فوراً
لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کراویں اور دودھ چڑاویں اور بچہ کو یا تو مصنوعی غذا سے پرورش
کراویں یا کوئی اچھی دودھ پلائی مقرر کریں۔

قبل یا بعد ولادت رحم سے خون جاری ہونا

کبھی قبل از ولادت اور کبھی بعد ولادت رحم سے خون جاری ہوتا ہے بحساب اوسط
تین سٹو ولادت میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ جان ہو۔ سبب یہ ہے کہ جب آنول دہن
رحم پر چسپاں ہوتا ہے تو مردہ کے وقت جب رحم کشادہ ہوتا ہے تو آنول کی رگیں
ٹوٹ کر خون جاری ہو جاتا ہے اس قسم کا سیلان خون حمل کے چھٹے مہینے سے آخر تک
ہر وقت ہو سکتا ہے۔ مگر آٹھ اور نو ماہ کے درمیان اکثر ہوتا ہے۔

علاج۔ حالت حمل میں خون جاری ہو تو مریضہ کو ہوادار مکان میں آرام سے ٹائے
رکھیں غذائیں ہلکا اور پٹلا کھانا جیسے آش جو دودھ اور اراٹوٹ حریرہ وغیرہ دیں اور
خاص مقام پر برف یا سرد پانی میں تولیہ بھگو کر رکھیں اور لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر علاج کرا
دوسری قسم۔ بعد ولادت سیلان خون ہونا۔ آنول نکلنے سے پہلے یا بعد یا کئی گھنٹے
یا کئی روز بعد خون جاری ہوتا ہے پچ پیدا ہونیکے بعد اگر رحم بہت کمزور ہو تو اکثر خون
جاری ہو جاتا ہے جب رحم سے آنول جدا ہوتا ہے اکثر پائو سو پاؤ خون نکلتا ہے
اس قدر اخراج خون چنداں مضر نہیں الا اگر خون بہت زیادہ خارج ہو تو زچہ کو
غشی آجاتی ہے پیلی بڑ جاتی ہے جسم سرد ہو جاتا ہے مریضہ ہانپنے لگتی ہے رحم
ملاکھ ہو جاتا ہے۔

وٹو چارٹری

جانا آنکھوں

نی۔ نازک

کا نہ ہونا۔

کمانے سے

تا ہے۔

ودہ نہ پھڑپا

مرض سل

وقت

بقدر دو روپوں

فائدہ کے

ت سے

ٹا اور زبا

پلاوے

ہیں ہوتا

رتوں کو

کی صحت

علاج۔ اصول علاج یہ ہے کہ رحم کی حرکت کو تحریک دیں تاکہ رحم زور سے سکڑے

اس واسطے شکم کے زیریں حصہ کو زور سے دبا دیں اور رحم کو ہاتھ سے مضبوط پکڑیں

سرد پانی میں کپڑہ بھگو کر اندام نہانی پر لگا دیں یقیناً سرد پانی پلا دیں کچھ کو پستان سے

لگا دیں شکم پر دو تین فٹ کی بندی سے سرد پانی دھار سے ڈالیں اور بذریعہ پیکاری

سرد پانی رحم کے اندر داخل کریں بیس گرین اسپیکا کو انیہ (Eucalyptus) (

ایک چٹانک پانی میں ملا کر پلا دیں اگر اسپیکا کو انیہ دستیاب نہ ہو تو چار تولہ سرکہ دو چٹانک

پانی میں ملا کر اس میں سے دو دو تولہ پندرہ پندرہ منٹ بعد تین مرتبہ پلا دیں مضرہ

کو ٹٹائے رکھیں بیٹھنے میں درد غشی کے سبب ہلاک ہو جائیگا اندیشہ ہے۔

لیکوڈاکٹر کٹ آف الگٹ (Ligature of Uterus)

ایک ڈرام تھوڑے سے پانی میں ملا کر تین تین گھنٹے بعد پلا دیں اگر بعد ولادت چند

گھنٹے یا چند روز کے بعد خون جاری ہو تو اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں رحم کا ڈھیلا

ہو جانا یا انول کا کوئی حصہ یا خون کا تو تھرا اندر رہا یا رحم کا شکر ٹٹا بالکل موقوف

ہو جانا یا زچہ کا دفعتاً ڈرجا نایا دلی جوش کے سبب خون جاری ہو جاتا ہے۔

کبھی درد زہ کی حالت میں زچہ کے زور سے کو تھنے کے سبب پھیپڑے سے ہوا نکل کر

گردن کے ملائم بناوٹ میں سمراہت کر جاتی ہے

گلے کی ملائم بناوٹ میں ہوا بہر جانا

علامات اُس مقام پر ہلکی ملائم پہولی ہوئی سو جن ہو جاتی ہے دبانے سے

ہوالی کر کر اہٹ محسوس ہوتی ہے

علاج۔ نیک شعورہ قلبی نو سیاہ پانی ۵ چٹانک ملا کر اس میں کپڑہ

بھگو کر لگا دیں یا سرکہ اور پانی ملا کر لگا دیں۔

دودھ کا بخار

بعد وضع حل اکثر بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کے درمیان پستانوں میں دودھ اتر آتا ہے اگر بچہ کو سردی لگ جاوے تو علامات ذیل پیدا ہو جاتی ہیں۔

علامات۔ لرزہ ہو کر جلد گرم ہو جاتی ہے نبض سریع ہو جاتی ہے ایک یا دونوں پستانوں میں درد ہو جاتا ہے سختی آ جاتی ہے دودھ اترنے میں دیر ہو جاتی ہے۔

علاج۔ اگر بعد ولادت بچہ کو لرزہ آ جاوے تو بوتل میں گرم پانی بہر کر پیروں کو سیکیں گرم کپڑہ پہناویں اور یہ نسخہ دیں

Mulle 45 820

قلبی شورہ لگ رہی

Spindle etheric Nutrient 3 dr اسپرٹس ایٹھریٹس نیٹرک ۱۔ تولہ

water 83

پانی پاؤسیس

اس میں سے ایک اونس یا ۲۰۔ تولہ عرق تین تین گھنٹے بعد پلاویں اکثر بخار زیادہ

تیز ہو تو پانچ گرین (۳۰۔ رتی) انٹی پائریں *Antipyrene*

قدرے برانڈی میں حل کر کے نصف چٹانکائی ملا کر پلاویں اور نسخہ مذکورہ بالا

جاری رکھیں اس سے خوب پسینہ آویگا دودھ اترنے کے وقت عموماً گزہ

آ جاتا ہے۔ یہ لرزہ بڑھ کر بھی دودھ کا بخار ہو جاتا ہے اور کبھی خطرناک بخار ہو جاتا

ہے۔ یا پستان بچ جاتے ہیں اور مواد پڑ جاتا ہے۔

علاج ایک خولک کبیسٹر ایل یعنی آرٹریکاتیل ویکو شکم کو صاف کریں سردی

لگتی ہو تو گرم کپڑا اوڑھاویں گرم چار پلاویں پستانوں کو سیکیں اگر پستانوں

میں ورم آ جاوے سخت اوگدہ دار ہو جاویں تو آہستہ آہستہ روغن سلاڈ

کی مالش کریں اور پستانوں میں اکثر بچہ کا منہ لگاتے رہیں اگر مواد پڑ جاوے تو

نکسار

پٹریں

ن سے

تاری

مہل

بچٹانک

میں نصی

ہے۔

ح

ت چند

تا وسیلا

وقت

ہو اکلک

ن سے

کپڑہ

نشر سے نکالیں پولیس لگا دیں اور مثل عام بھڑے کے علاج کریں۔

پیو آرپرل فیور یعنی زچہ کا خطرناک بخار

کبھی کبھی بعد وضع حمل رحم میں مواد جمع ہو کر سڑ جاتا ہے اور خون میں جذب ہو کر یہ بخار پیدا کرتا ہے یہ بخار بڑا خطرناک اور بڑا چھوت والا ہے۔

علامات۔ بعد وضع حمل سردی سے لرزہ اگر جسم گرم ہو جاتا ہے بعد اس کے پسینہ اگر قدرے افاقہ ہو جاتا ہے پستانوں میں ورم آ جاتا ہے رحم سے رطوبت خارج ہوتی ہے یہ علامات دودھ کے بخار کی ہیں جس کا ذکر اوپر گزرا۔ اور اگر پسینہ اگر افاقہ نہ ہو اور پستانیں ملائم اور چوٹی ہو جاویں اور رحم سے رطوبت کم خارج ہو یا بالکل خارج نہ ہو اور ضربات نبض ایک منٹ میں ۲۰ تک ہو جاویں اس صورت میں زچہ کے خراب بخار کا شبہ ہوگا۔ اگر مریضہ کی طاقت ذائل ہو جاوے تنفس قوت سے آنے لگے دودھ خشک ہو جاوے چھوٹے سے شکم میں درد ہو صفراوی قی آوے تشنگی زیادہ ہو پسینہ کثرت سے آوے زبان میلی ہو تنفس میں بدبو آوے چہرہ پر ورم آ جاوے دست آنے لگیں اور دستوں میں سدے خارج ہوں اور کسی ایک جوڑ میں یا کئی جوڑوں میں ورم آ جاوے تو یہ زچہ کا خطرناک بخار ہے۔ یہ بخار متعدد سی ہے بذریعہ دانی ایک زچہ سے دوسری زچہ کو لگ جاتا ہے۔

علاج۔ سب سے پہلے امعاء اور جلد کی طرف غور کریں اور نسخہ ذیل دیویں

۱۰ Compound Rheubarb pills ۲۰ گریں

Podophilli Resin ۱/۲ gr

Ext Hypocyanis ۱ gr

for on/pill - سبکی ملا کر ایک گولی بنا کر کھلاویں اور چار گھنٹے بعد یہ نسخہ دین۔

Sulphate of soda اور ایک ہمارے نمک ایک
Tincture of ginger 30 drops ۳۰ قطرے
water 2 3 for a dose پانی ایک چٹانک ملا کر پلاویں۔

اور ایک چٹانک ارٹھی کاتیل صابون اور گرم پانی میں ملا کر حقہ کریں اور سیتل
یا تینس قطرے کا تھی سلون (Condys solution)

گرم پانی میں ملا کر بندریہ پکاری رحم میں داخل کریں شکم پر لہسی کا پوٹیش باندھیں ہوا
مکان میں رکھیں اور دافع عفونت ادویہ کا اچھی طرح استعمال کریں پرمیگنٹ آف

پٹاس Permagnate of Potash کا تیز عرق زچہ خانہ میں
چھڑکیں وائی وغیرہ کے ہاتھ لاسی عرق سے دھولاویں غذا بخش شوربہ وغیرہ دیں۔

فلکیا دوس

بعد وضع حمل بعض زچہ کو ایک ہفتہ سے پانچ ہفتہ کے اندر کبھی ایک اور کبھی دونوں
ٹانگوں میں رانوں سے شروع ہو کر سپروں تک درد اور درم ہو جاتا ہے۔

علامات۔ سردی سے لرزہ ہو کر بخار آ جاتا ہے نبض میرج ہو جاتی ہے جی متلاپتا
تشنگی زیادہ ہوتی ہے زبان سفید ہو جاتی ہے درد کم ہوتا ہے درم کا مقام گرم اور چوڑے
سے درد معلوم ہوتا ہے چمکدار اور پیلا ہو جاتا ہے زچہ اپنا پیر پیلا نہیں سکتی یہ مرض
اچھا ہو جاتا ہے مگر صحت بدیر ہوتی ہے بعض اوقات برسوں تک پیر سخت اور
دردناک رہتا ہے۔

علاج سو بے ہوئے مقام کو پوست کے گرم بخوشاندہ سے بار بار سینکین لیکن
ملینیات جیسا کہ اوپر بیان ہوا دیں اور شورہ قلمی اور بیٹرک تہر جس کا نسخہ زچہ کے
خطرناک بخاریں لکھا گیا دیں درد کو کلورال ہیڈریٹ Chloral Hydrate

سے دور کریں جب بخار اور درد جاتا رہے تو سو بجے ہوئے پیر کو مساوی مقدار برانڈی شراب اور روغن سلاڈ ملا کر مالش کریں اور فلائین کی ٹپی باندھ دیں اور پانچ یا چھ کریں ایوڈائٹات بٹاسیم *Sulphide of Potassium* نصف چٹانک پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ پلاویں غذا مقوی اور زود فہم دیں۔

زچہ کی دیوانگی

بعض حمل یا دودھ پھڑکنے کے زمانہ میں خصوصاً جبکہ عرصہ تک دودھ پلایا ہو تو گاہ گاہ زچہ کو خفیف حرارت کے ساتھ یا تشنج کے بعد زچہ کے بخار کے بعد یہ مرض شروع ہو جاتا ہے علامات مریضہ بک بک کرتی ہے ہنستی ہے یا گاتی ہے یا کبھی بخش باتیں کہتی ہے گا ہے پچہ کے مار ڈالنے کا قصد کرتی ہے۔ آخر کو مالتھولیا ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات اعمار مستقیم میں سڈے ہو جاتے ہیں اور مریضہ کمزور ہو جاتی ہے۔

انجام۔ نمو ماچند ہفتے میں صحت ہو جاتی ہے اور اگر مریضہ کے خاندان میں موروثی دیوانگی کا مرض ہو تو صحت دیر میں ہوتی ہے۔

علاج۔ سہل اور تھنہ سے شکم کو صاف کریں پچہ کا دودھ پھر ادیں۔ اٹا کا یا گانے کا دودھ پلا دیں مقوی ادویہ اور اغذیہ کا استعمال کریں مریضہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اگر مریضہ کا میلان خود کشی یا پچہ کے مارنے کا ایک سیکوئل کرنے کا ہو تو اس کو تدابیر مناسب سے باز رکھیں ایسی عورت دودھ پلانے کے قابل کبھی نہیں ہوتی۔

ammonia امراض رحم

ایمونوریا یعنی احتباس حیض اس مرض میں یا تو خون حیض کم آتا ہے

معمولی طور پر عورت کو تیسرا چودہ سال کی عمر میں حیض آنا شروع ہوتا ہے اور چوبیس سال یا پینتالیس سال کی عمر میں بند ہو جاتا ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

اول حل اور دودھ پلانے کے زمانہ میں بند ہو جاتا ہے (دوئم) معمولی عمر تک پہنچ کر لڑکی کو حیض نہیں آتا یعنی حیض آنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ (سوم) لڑکی کو حیض آنا شروع تو ہو جاتا ہے مگر علی رکاوٹ کے سبب خارج نہیں ہوتا (چہارم) حیض ایک وقت تک جاری رہ کر بند ہو جاتا ہے اور خون حیض یا تو کسی علی رکاوٹ کے سبب یا رحم کے کسی مرض کے سبب بند ہو جاتا ہے۔

(پنجم) آخر عمر میں قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے یا جسم میں خون کم ہونے کے سبب حیض نہیں آتا جب حل کے سبب حیض بند ہو گا تو علامات حل پایا جائیگا یا دودھ پلانے کے سبب بند ہو گا تو تشخیص کی ضرورت نہیں ان دونوں صورتوں میں علاج کی ضرورت نہیں پانچویں قسم جس حیض کا ذکر پچھلے اوراق میں گذرا (دیکھو صفحہ ۲۱) دودھ پلانے کے زمانہ میں اگر عورت حائضہ ہو جاوے تو دودھ چھڑا دینا چاہئے کیونکہ عورت دو قسم کے اخراج کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم جب لڑکی کو معمولی عمر میں حیض نہ آوے تو علامات ذیل نمود ہونگی۔

علامات۔ لڑکی پہلی کمر اور رقبہ ہو جاتی ہے پتائیں چھوٹی رہ جاتی ہیں ہاتھ پیر اور چہرہ پر ورم آ جاتا ہے پشت اور کمر میں نوبتی درد ہوتا ہے اندام نہانی سے سفید رطوبت خارج ہوتی ہے تھوڑے صدمہ سے دل دھڑکنے لگتا ہے اشتہا بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ لڑکی کہہ یا مٹی۔ کوئلہ یا ایسی قسم کی اور چیزیں کھاتی ہے بد مزاج ہو جاتی ہے چہرہ پر ہما سے نکل آتے ہیں یا چوٹے چوٹے دانے جن میں سوا نہیں ہوتا یا اینڈلیوں میں چہا جن نکل آتی ہے شدید حالت میں چہرہ پر ورم آ جاتا ہے چہرہ سیاہ یا سبزی مائل ہو جاتا ہے اور علامات

برائدی
ریں
نہت

گاہ
باتا
کتی
قات

تی

ے کا
نس
ایسر

آنا

مرض کو ریا کے ظاہر ہوتی ہیں۔

علاج مقویات ادویہ خصوصاً مگرکبات فولاد سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی اور دوا بہم نہ پہونچے تو صرف ہیرکسیس تین یا چار کریں ایک اولس پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ پلاویں مگر جب ایام حیض قریب آویں تو تین روز پہلے سے تین روز بعد تک اس دوا کو نہ دیں ہو ادرجکے میں چلنے پہرنے کی ہدایت کریں مگر اس قدر کے تک نہ جائے مقوی اور زود ہضم غذا کھلاویں ہو ادر مکان میں رکھیں خوش مزاج لڑکیوں میں کھیلنے دیں جب حیض کے دن نہ ہوں تو ہر روز صبح کو سر پانی سے غسل کراویں نخلستان اور نتاشہ گاہوں کی سیر کراں شکم کو مائیٹات سے صاف رکھیں پانی میں نمک ملا کر غسل کراویں جب حیض آنے کے دن قریب آجاویں تو ایک یا دو روز قبل ہر روز شب کو گرم پانی میں قدرے رائی کا سفوف ملا کر مریضہ کے پیروں کو ڈالیں یا مگر تک بیٹھیں سرد پانی سے بچاویں ہرقیم کی جوش لانے والی تحریک سے روکیں پشت اور کمر میں درد ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت خود اس رطوبت کے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر گرم پانی میں بیٹھانے سے فائدہ نہ ہو تو شکم کے زیریں حصہ پر دو تین روز تک رائی کا بلاسٹر لگاتے رہیں اور یہ نسخہ ہیرکسیس صاف کیا ہوا ایلوا۔ ریونڈیسی کا باریک سفوف سب کو ملا کر ۱۲ گولیاں بنا دیں۔ دو گولیاں ہر شب کو کھلا دیں کریں اور جب ایام حیض گزرجاویں تو یہ نسخہ دیں اسٹیل دیں steel wine ۲ ڈرام پانی آٹھ اولس اس میں سے ایک ایک اولس دن میں تین مرتبہ پلاویں اور جب ایام حیض قریب آجاویں تو ایک ہفتہ پہلے سے ان گولیوں کا استعمال کریں۔

Permagmatic of Potash 2 grs ۲ گرین
Ext of Gentian 2 grs ۲ گرین
for a pill - one pill to be taken 3 times
a day

اس کی گولیاں بنا کر ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ دیں۔
جب یہ مرض قوی عورتوں کو ہوجن کارنگ سُرخ ہو قوی اور توانا ہوں پستانیں بڑی
ہوں قد و قامت اچھا ہو تو یہ علامات ہونگی۔

علامات۔ چہرہ کُہر ہوتا ہے اور جب حیض کا وقت آتا ہے تو اُپشت اور کمر میں درد
ہوتا ہے چہرہ تھماتا جاتا ہے درد سر اور دوران سر ہوتا ہے ان علامات کے شروع ہونے
سے قبل یہ نسخہ دیں۔

Compound Rhubarb pill ۲۰ گرین۔
2 1/2 grs

Ext. of hyoscyamus 1/4 grs
for a pill
to be taken at bed time
اکٹرکٹ ہائے ساس ۱ ۱/۴ گرین۔
اسکی گولیاں بنا کر شب کو کھلاویں۔

اگر اس سے کھل کر دست نہ آوے تو صبح کو یہ نسخہ دیں۔

Sulphate of Soda 36 ڈرام
Sinctura ginger 20 drops قطر
water 23
for a dose
پانی ایک چمٹا تک ملا کر پلاویں۔

اس علاج کو دو تین روز تک جاری رکھیں اور رانی کا پلاسٹر زیریں حصہ شکم پر لگاتے
رہیں اس سے انشاء اللہ حیض آجاوے گا۔ اگر کامیابی نہ ہو تو تین یا چار جو تکیں ہر ران
کی جڑ میں لگا دیں اور زخموں کو گرم پانی سے سینکیں تاکہ اچھی طرح خون نکل جاوے
اسی طرح ہر جینے کرتے رہیں یہاں تک کہ حیض جاری ہو جاوے بعد اس کے ہر جینے
حیض آنے کے وقت شب کو گرم پانی میں چٹھیا کریں ہلکی غذا جس میں نشاۃ ہو دیا کریں

اور دو

تین

اس

نہ جاوے

میں کھینے

نان اور

ملا کر غسل

روز شب کو

نیک بیٹا

ت اور کمر

نے کی کوشش

پر دو تین روز

ریونڈ پیسی

و کھلا دیا کریں

۲ ڈرام

میں اور جب

Perme

Ext of

for a

بیسے سا گودانہ اراروٹ کپڑی ولیہ وغیرہ ہو اور جگہ میں تقریح کراویں خانہ داری کا کام کرائیں اگر کو لیں بوجہ معلوم ہو یا کولہ بہرہ معلوم ہو تو لیڈی ڈاکٹر کو ملا خط کرائیں بعض اوقات جہلی بکارت میں سوراخ نہ ہونے کے سبب خون حیض رُک جاتا ہے تیسری قسم اس میں خون جین کچھ عرصہ تک جاری رہ کر بند ہو جاتا ہے قاعدہ ہے کہ شروع میں جب لڑکی کو حیض آتا ہے تو برابر ہر ماہ یا قاعدہ نہیں آتا کیونکہ طبیعت ابھی عادی نہیں ہوتی اور آتی سبب سے رُک جاتا ہے۔

اسباب سرد پانی میں پیرہن بگڑنا گیلی زمین پر بیٹھ جانا سرد پانی سے غسل کرنا سرد ہوا کے رُخ کھڑا ہونا تھک جانا شہتہ کرنا ڈھونا طبیعت میں جوش پیدا ہو جانا دماغی مشقت زیادہ کرنا ان اسباب سے اکثر حیض بند ہو جاتا ہے جب حیض وقتاً بند ہوگا تو علامات ذیل پانچا دیں گی۔

علامات - درد سر مستی کا ہلکی زیریں حصہ شکم میں درد ہونا۔ سرد پانی میں غسل کرنے سے کبھی مرض کُزار ہو جانا اگر خون حیض بار بار بند ہو جا کرے تو وہی علامات جس حیض کی جنکا ذکر اوپر گذرا بلکہ اس سے ہی زائد ظاہر ہو وینگی جب کسی کمزور کرنے والے مرض کے سبب حیض بند ہوتا ہے تو وقتاً بند نہیں ہوتا بلکہ تدریج جیسے مرض بدل یا مرض گروہ جیسے ایبومن جوانڈی کی سفیدی کی مانند ہوتی ہے قاروہ میں پانی جاتی ہے یا بعض قسم کے سیلان خون میں حیض بند ہو جاتا ہے تو وہ علامات جن کا ذکر اوپر گذرا نہیں پائی جاتیں بلکہ اس کمزور کرنے والے موجودہ مرض کی علامات جس کے سبب حیض بند ہوا ہے پائی جاتی ہیں ایسی حالت میں حیض جاری کر دینا کی کوشش یہ کار ہے بلکہ اس اصلی مرض کا علاج کرنا چاہئے جو حیض بند ہونیکا سبب ہے۔
علاج جب تندرست قوی عورت کا کسی سبب سے حیض بند ہو جاوے تو اسکی قوت کو کم کرنا چاہئے بخلاف کمزور عورت کے کہ اسکی قوت کو مرکبات خولا اور

دیگر مقوی اور تین ادویہ سے بڑھانا چاہیے۔ اور جب خون حیض جاری رہ کر وفتا
بند ہو جاوے تو ہر قسم کی مرہضہ کو خواہ قوی ہو یا کمزور گرم پانی میں جس کی حرارت ۱۰۰
درجہ فرین ہیش کی ہو پٹھاؤ میں خصوصاً جب سردی لگنے کے سبب بند ہوا ہو۔

چوتھی قسم جب کسی علی رکاوٹ کے سبب یا مرض کے سبب بند ہوتا ہے تو چون
لڑکیوں میں رکاوٹ کے سبب اکثر بند ہوتا ہے اور بڑی عورت میں اکثر مرض رحم کے
سبب بند ہوتا ہے دونوں صورتوں میں لیڈی ڈاکٹر کو فوراً ملاحظہ کرویں تاکہ اگر
کوئی تشہی نقص یا رکاوٹ ہو تو درست کر دے یا مرض ہو تو اسکا علاج کرے ویر
کرنے سے تکلیف بڑھ جاوے گی۔

پانچویں قسم کا بیان پچھلے اوراق میں گذر گیا ہر قسم کے جس حیض میں لیڈی ڈاکٹر
سے علاج کرویں تاکہ سبب کو معلوم کر کے ٹیک علاج کرے۔

دوسری یا یعنی عسرت حیض

یہ مرض سبب احتباس عین کے زیادہ ہوتا ہے اکثر تو رحم یا خیمیتہ الرحم میں اجتماع
خون ہونے سے ہو جاتا ہے مگر جب کہیں رحم اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہو یا سمٹ جاتا ہے
یا وہیں رحم تنگ ہو جاتا ہے تو یہ مرض ہو جاتا ہے اور گاہے مرض نفوس کا مادہ جسم
میں ہونے کے سبب بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات شکم کے زیرین حصہ میں بڑا ران سے کچھ اوپر اکثر بائیں جانب برہمی لگنو
کی مانند شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ درد راتوں تک بڑھتا ہے اور بار بار دورہ کے
ساتھ ہوتا ہے یہ درد کبھی اس شدت کا ہوتا ہے کہ مرہضہ لوٹی لوٹی پھرتی ہے جیسا کہ
درد فوج میں ہوتا ہے جی متلاتا ہے فے ہوتی ہے اور دست آتے ہیں پیشاب کی

اری کا

حفظ کریں

باتا ہے

ہے قاعدہ

طبیعت

کرنا سو

تا دماغی

نابند ہو جا

غسل

لغات

در کرنے

مرض

وہ میں

ت جن کا

ت جس

کی کو

ہے۔

تو اسکی

یلا اور

حاجت معلوم ہوتی ہے اور پیشاب کرنے میں درد معلوم ہوتا ہے رانوں کی جڑوں میں جب زیادہ درد ہوتا ہے تو قصبتہ الرحم میں اجتماع خون کا ہونا ثابت ہوتا ہے یا گوشت کی علامات اکثر پائیداری میں یہ علامات حیض آنے سے چند گھنٹے یا چند روز قبل ظاہر ہوتی ہیں مگر اکثر حیض آنے سے ۲۴ گھنٹے قبل نہایت شدت کا درد ہوتا ہے جب حیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو درد اور دیگر علامات مرض اکثر جاتی رہتی ہیں یا جب تک خون کے ڈے او جھتی کے ٹکڑے نکلا کر سٹے میں علامات مرض اور درد قائم رہتا ہے اور جب حیض آچکنا ہے تو درد اور علامات مرض جاتی رہتی ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس قدر خون نکلتا ہے اسی قدر شدت کا درد ہوتا ہے ایسی عورتوں کو حرجت کے زمانہ میں اکثر فتور ہاضمہ بھی رہتا ہے اور علامات ذیل پائی جاتی ہیں۔ یعنی چہرہ متما یا ہوا۔ کھانسی اختلاج قلب چہرہ کا عصبی درد سر کے کسی خاص مقام پر ہوتا ہے یا بائیں پہلو میں یا شانہ کی ہڈی کے نیچے یا ریڑھ کی ہڈی کے سب سے نیچے کے حصہ میں درد ہوتا ہے اس سے عورتوں کو کثرت الحیض اور لیو کوریا کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔

علاج۔ پوٹو فائین کی گولی جس کا نسخہ جس حیض کے علاج میں لکھا گیا ہے یونے تاکہ قبض رفع ہو شکم صاف رہے سردی سے بچاویں۔ دلی خیالات اور جوش کو نہوتے دین خانہ داری کا کام کرتے رہیں سست نہ ہونے دین چلا پھر کتفرج کر اویں تاکہ قبض نہوتے پائے۔ درد کے شروع ہوتے ہی مرہضہ کو گرم پانی میں بٹھاویں اس اکثر درد کو افاقہ ہو جاتا ہے گرم پانی سے نکلنے کے بعد جسم کو خوب پونچھ کر بلینگ پر لٹاویں اور فلائین کے ٹکڑوں کو گرم پانی میں بھگو کر شکم کے زیرین حصہ پڑو اور خاص مقام کو سیکیں اگر گرم پانی میں بیٹھنا نہ ہو سکے تو شکم کے زیرین حصہ کو گرم پانی سے خوب سیکیں اور تیس بوتل کلو روڈین ایک انس پانی میں ملا کر

پلاوین اگر باؤ گولہ یا عصبی امراض کی علامات معلوم ہوں تو سال و دسے ٹابل ۴۰
 قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر پلاوین اور پرو مایڈاٹ پٹاسیم دس گرین ایک
 انس پانی میں ملا کر دو دو گھنٹہ بعد پلاوین اگر یہ درد دن میں ایک یا دو یا
 نوبت سے ہوتا ہو تو یہ نسخہ دین۔ کونین ۳ گرین

Quinine 3 grs
 Compound Tincture of
 Cinchona 20 drs
 Water 1 oz
 پانی ایک اونس سبکو ملا کر دین میں میں مرتبہ پلاوین
 چلے پھرنے دین تفریح کر اوین غذا اچھی رو، ہضم دین میوا دار کمرہ میں سولاوین
 در در فتمہ کرنے کے واسطے
 Tincture Cannabis Indica 4 drs
 شکر

کئے جس ان ڈیگا ہم قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دو دو گھنٹہ بعد پلاوین افاقہ کی حالت میں یہ نسخہ دین

Sulphate of Iron 9 grs	۹ گریں	سلفیٹ ات ایرن
Quinine 12 grs	۱۲ گریں	کوئینین
Dilute sulphuric acid	ایک ڈم	ڈیلیوٹ سلفیوک ایسڈ
water 12 ^{1 dr} oz	۱۲ اولش	پانی

اس میں سے ایک ایک ولس دن میں تین مرتبہ پلاوین اگر علاج مذکورہ بالا سے صحت نہ ہو تو لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کرویں تاکہ معلوم ہو کہ رحم اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے یا کچھ اور رُکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔

یہودی اجماع کثرتِ حنین

یہ مرض تین طرح پر ہوتا ہے۔ اول یا تو خلاف معمول حیض بار بار ہوئے

یا ایام مقررہ پر تو آوے مگر عرصہ تک چار گنی سوم ٹھیک وقت پر آوے کہ مقدار خون معمول سے زیادہ خارج ہو۔

علیٰ الجہوم حیض ۲۸ دین روز آتا ہے اور تین روز رکھ کر موقوف ہو جاتا ہے اور ہر ایام حیض میں تقریباً چار اونس خون خارج ہوتا ہے گو اس قاعدہ سے استثناء بھی ہوتا ہے۔ مگر اس جگہ اگر اس قاعدہ کے خلاف ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ نقص واقع ہوا ہے۔

یہ مرض دو مخالف قسم کی عورت میں دیکھا جاتا ہے ایک قوی اور دوسری کمزور۔

اول قوی عورت کو جن کے جسم میں خون زیادہ ہوتا ہے انکا چہرہ سرخ اور جسم قوی اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ انکو جب یہ مرض ہوتا ہے تو یہ علامات پائی جاتی ہیں چہرہ تھمٹا ہوا ہوتا ہے بخار کی علامات پائی جاتی ہیں۔

اور جب کمزور عورتوں کو ہوتا ہے تو علامات ذیل دیکھی جاتی ہیں۔ مریضہ کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ سُستی اور کاہلی ہوتی ہے نبض کمزور اور غشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ عصبی درد ہوتا ہے دل بیٹھا جاتا ہے نفخ شکم اور فتور یا صمہ ہوتا ہے لپشت کمزور اور رانوں میں بیٹھا بیٹھا درد ہوتا ہے۔

اسباب عرصہ تک دو وہ پلانا۔ جلد جلد حاملہ ہونا یا لگام اور نفیس بستہ پر سونا۔ بہاری یا بیجا مہ یا لہنگا لٹکائے رکھنا زیادہ عرصہ تک کھڑا رہنا مرطوب اور گرم مکان میں رہنا۔

علاج یہ قسم کی مریضہ کو جب خون حیض کثرت آوے تو چپٹ لٹا دین شور و غل نہونے دین اگر خون بہت زیادہ خارج ہوتا ہو تو سرد پانی میں کپڑہ بہگو کر یا برف کو ٹھیلی میں بھر کر زیر ناف اور رانوں کے درمیان لگا دین۔ اگر

عورت قوی ہو تو ہلکا کھانا دین جیسے دودھ چاول کچھری یا دلیہ وغیرہ اور تشنگی رفع کرنے کو مفرح عرقیات پلا دین جیسے آتش جو سرد لیمن ایڈ سوڈا و اثر یا سادہ شربت میں عرق لیمن ملا کر پلا دین یا شربت لیمن۔ شربت انا کیوڑہ بید مشک گلاب ملا کر پلا دین شربت الی بھی مفید ہے۔ اور اگر مریضہ کمزور ہو تو مقوی زود ہضم غذا اچھی طرح کھلا دین غشی دور کرنے کے واسطے کوئی محرک دوا دین اس سے خون میں تحریک ہو کر خون زیادہ خارج ہوگا مریضہ کو آرام سے لٹائے رکھیں لیٹا رہنے سے خود بخود غشی جاتی رہیگی سیلان خون کی حالت میں ہر چیز سرد و بجا فے گرم چیز سے خون زیادہ خارج ہوگا اس سے مریضہ کے جسم میں مالریا ہوا کا اثر جس سے بخار پیدا ہوتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے سو واسطے کوئین دینا مفید ہے۔ نسخہ۔ کوئین ۱۲ گریں کو عرق لیمن میں حل کر کے چہرہ اولنس پانی ملا لیں اور ایک ایک اولنس دن میں تین مرتبہ پلا دین چونکہ ہیکر کا فعل اکثر درست نہیں ہوتا اس واسطے قبض رہتا ہے۔ پس حیض آنے سے قبل اگر قبض ہو تو قوی عورت کو تکلیف سہل دین اور کمزور عورت کو ارٹھیکا تیل دیکر رفع قبض کر دین افاقہ کی حالت میں مریضہ کو ہوا داکرہ میں سلا دین پلنگ بڑا یا بچھونا ہو بلکہ درمی وغیرہ یا اسی قسم کا سخت بچھونا ہو قبض نہونے پاوے تین یا چار گریں ہیرا کیس تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں دو یا تین مرتبہ پلا دین اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قوی عورتوں کو علاوہ ہلکی غذا و تکلیف مسہلات کے یہ نسخہ دین

Sulphate of Soda 6 dr ۶ ڈرام سلفٹ آف سودا

Dilute Sulphuric acid ۱ dr ایک ڈرام دلیوٹ سلفورک ایسڈ

Rose water 8 ۸ اونس خسانہ گلاب

اس میں سے ایک ایک اونس چار چار گھنٹہ بعد پلا دین اور جب خون بہت زیادہ آتا ہو تو نسخہ ذیل دیوین۔

سکر

ہ اور

تشنگی

یہ کہ

سری

خ اور

علامات

نگ

مین۔

نیشٹ

بشرہ پر

یب اور

ن شور و

ہگو کر

اگر

شوگر آف لڈ

۴ گرین

افیون

۴ گرین

ملا کر ایک گولی بناوین

ایک ایک گولی دین تین مرتبہ دیویں۔ اگر اس سے بھی خون بند نہ ہو تو سو پانی کی بچکاری لگاویں یا خوب گرم پانی بذریعہ بچکاری اندر داخل کریں۔ اگر اس سے بھی خون نہ رکے تو سیلفٹ آف زنک دس گرین آہستہ

اولس پانی میں ملا کر بچکاری لگاویں۔ یا ایک ڈرام لیکوئڈ آکسٹرکٹ آف ارگٹ اور دس بوند لاٹم ملا کر چار گھنٹہ بعد قدرے پانی میں ملا کر پلاویں افاقہ کی حالت میں اگر عصبی علامات یا باؤ گولہ کی علامات پائی جاویں تو برومائیڈ آف پٹاسیم دس گرین پانی ایک اونس ملا کر دین میں تین مرتبہ پلاویں۔ اگر سیلان خون صرف یام حیض میں ہوتا ہو تو ایک ہفتہ قبل دوا شروع کر دیں اور جب سیلان خون موقوف ہو جائے تو دوا بند کر دیں اور اگر سیلان خون وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہو تو دوا برابر جاری رکھیں جب تک کہ خون کا آنا موقوف ہو جاوے۔ علاج شروع کرنے کے پہلے روز بعد سے دو اکی مقدار دو چہند کر دیں۔ مگر زور عورت کو چہہ گرین کی مقدار میں ٹارٹریٹ آف ایرن *Tartrate of Iron* اور پانچ گرین برومائیڈ آف پٹاسیم *Bromide of Potassium* پانی میں ملا کر دین میں تین مرتبہ پلاویں۔

سوزش رحم

یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ حاد اور مزمن۔ یہ مرض کہیں فتور رحم کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں

بلافتور رحم
اول سوزش رحم حاد۔ علامات سردی لرزہ سے شروع ہو کر نفیض تیز ہو جاتی ہے۔ بدن گرم ہو جاتا ہے نیز زناٹ درد ہوتا ہے جو دبائے سے زیادہ

ہوتا ہے کہی تمام کمین پھیل جاتا ہے۔ مریضہ بیرون کو سمیٹ کر شکم سے لگائے کہتی ہو
 کر اور رانوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ پیشاب گرم چلتا ہوا تکلیف کیشتا بار بار ہوتا ہے۔ درد
 ہونے سے گدہ ہو جاتا ہے شکم بھاری معلوم ہوتا ہے اور نیچے کو گر اجاتا ہے۔ شکم
 پھول جاتا ہے کم و بیش بخار رہتا ہے اکثر جی متلاتا ہے فے ہوتی ہے دو تین روت
 کے بعد ہلکے رنگ کا مواد رحم سے خارج ہوتا ہے رقتہ رقتہ مواد کا رنگ سیاہی مائل
 ہو جاتا ہے جس سے کپڑے پر زرد سُرخ مائل داغ پڑ جاتا ہے اکثر دست آتے ہیں
 اگر مریضہ کو بواسیر ہو تو مسون میں ورم آ جاتا ہے جس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
اسباب سردی لگنا خصوصاً بعد وضع حمل یا ایام حیض میں چوٹ لگنا اگر ٹپنا
 حیض کا بمقاعہ ہونا۔ تیز دوا کا لگانا۔ یا تیز دوا کی بچک بچک لگانا خراش دار دوا کی بستی
 اندر رکھنا۔ کثرت جماع۔ وضع حمل میں چوٹ لگنا عرصہ تک کھڑا رہنا۔ یا چلنا پھرنا۔
علاج۔ مریضہ کی عمر کے موافق فی سال ایک جو تک کے حساب سے
 مقام در پر جو نکین لگاویں زان بعد سینک کریں۔ اگر مرض شدید نہ تو راسی کا پلاسٹر
 لگاویں۔ نکین مفرح عرق میں دس یونڈ لاڈلہ ملا کر پلاویں اگر دست نہ آتے ہوں
 تو روغن بید بخیر سے شکم کو صاف رکھیں کیونکہ اس مرض میں امعاء مستقیم میں سے
 جمع ہو کر رحم کو دباتے ہیں جس سے رحم میں خراش ہو جاتا ہے۔ غذا ہلکی اور پتلی
 دیویں جیسے دودھ چاول تیلی کھجری دلیہ دودھ کے ہمراہ۔ حریرا۔ آتش جو وخنیزہ مریضہ
 کو لٹائے رکھیں۔ چلنا پھرنا کھڑا رہنا بیٹھنا مضر ہے۔ اس سے خون جاری ہو جاتا
 ہے۔ اس مرض کے علاج میں اگر غفلت کیا دے تو رحم کے گرد و نواح کسی مقام
 میں پیپ پڑ جاتا ہے جس سے مریضہ کو سخت نقصان پہنچتا ہے
 مواد پڑ جانے کی علامت یہ ہے کہ موجودہ درد کے ساتھ لرزہ اور سحر
 عود کرتا ہے۔ اس صورت میں مریضہ کو فوراً گرم پانی میں نصف گھنٹہ تک

ی
 ے
 نہ
 اور
 ین
 ین
 ین
 ے
 ت
 بعد
 سات
 یم
 ۱۰۳

ی
 تیز
 یادہ

یا اس سے زائد عرصہ تک بٹھاوین حتیٰ کہ غشی کے آثار نمود ہوں اس سے سوزش
رک جاتی ہے بعدہ جسم کو اچھی طرح پونچھ کر خشک کر لیں اور رضائی یا کپڑا کر
لٹاویں اور دس گرین ڈوڈرس پوڈر ۱۵ سیکسہ ۵۰ مل ۵۰ سے ۵۰
کھلاویں اور دو گھنٹہ بعد آتش جو پلاوین تاکہ خوب پسینہ آجاوے کیسٹرائل سے
شکم کو صاف کریں یا سٹنٹ آف میگنیشیا میں قدر سے اقیون ملا کر یا بلا اقیون
مٹھوڑا پانی ملا کر ملاپتے رہیں۔ مریضہ کو آرام سے لٹائے رکھنا۔ غذا کو باقاعدہ
اچھی طرح دینا۔ امعا کو صاف رکھنا کافی علاج ہے۔ اگر زیادہ علاج کی ضرورت
ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

مفر من سوزش رحم۔ یہ مرض یا تو آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ یا
حاد مرض کے بعد مفر من ہو جاتا ہے۔

علامات۔ زیر ناف کم و بیش درد ہوتا ہے۔ اندام نہانی سے سفیدی
خارج ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گو یا رحم گرا جاتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے
اور درو کے ساتھ حقیض آتا ہے۔ یہ حالت خصیتہ الرحم میں کیسٹرائل خوان
ہو جانے کے سبب ہوتی ہے اور فتور ہا غنہ بھی کیسٹرائل ہوتا ہے اگر عرصہ تک
آرام نہ ہو اور یہ مرض قائم رہے تو خاص رحم یا اسکے گرد و نواح کی ساخت میں
فتور آ جاتا ہے۔ مثلاً رحم بڑھ جاتا ہے۔ یا اپنی معمولی جگہ سے ہٹ جاتا ہے
یا رحم کے گرد مواد پڑ جاتا ہے یا دہن رحم میں زخم ہو جاتے ہیں۔

علاج۔ رائی کا پلاسٹر زیر ناف لگاویں یا پنچر آکوڈین جب تک مریضہ برداشت
کر سکے لگاتے رہیں۔ دن میں اکثر مریضہ کو لٹائے رکھیں قبض نہوئے دین اگر ہو تو
روغن میدا بنجر سے رفع قبض کریں۔ اگر بواسیر ہو تو اسکا علاج کریں۔ مریضہ کو
سرد پانی میں روزانہ بٹھاویں یا ریڑھ کے اوپر سرد پانی کا تڑاڑ ہر روز دلیں

۱۲۰۱۲

۱۵۷۱۸

مقوی اور بیکار استعمال کرین کو مین اور مکیات فولاد کا استعمال کرین مقوی اور زود ہضم غذا اچھی طرح
دیون۔ لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کرادین۔ اگر رحم ٹل گیا ہو تو ہشیک کرادین بعض اوقات
ایوڈائیڈان پٹایسم سے فائدہ ہوتا ہے۔

رحم کا اپنی جگہ سے مل جانا

رحم اکثر اپنی معمولی جگہ سے نیچے کو سرک آتا ہے چونکہ رحم کی شکل ناسپاتی کی مانند ہے
اس واسطے کہی سانس اور کہی پیچھا اور کہی واپس اور کہی یا مین کو جھک جاتا ہے رحم کی
باریک گردن مڑ جاتی ہے اور رحم کا جسم جو ایک بہاری چیز ہے کسی ایک جانب کو جھکا
ڈکرا دیا ہوا جھک جاتا ہے۔

اسباب۔ کثیر الاولاد ہونا۔ بعد وضع حمل جلد کاروبار میں مشغول ہو جانا۔
اکرنہ کسر باند ہنا جس سے رحم نیچے کو سرک آتا ہے بہاری بوجہ اٹھانا پیشاب
کا بند ہو جانا۔ رحم کے رباطات کمزور ہو کر ڈھیلے ہو جانا یا عام کمزوری کی سبب کہی
رحم ہٹ جاتا ہے۔ رحم کا ٹل جانا کم سے کم درجہ سے لیکر زیادہ سے زیادہ درجہ تک ہوتا
ہے کہی اس قدر ہٹ جاتا ہے کہ بالکل جسم کے باہر نکل آتا ہے اور کہی ہٹ کر
اپنے گرد و نون کے اعضاء پر دباؤ ڈالتا ہے جیسے مثانہ۔ امعاء مستقیم شرا مین
اور اعصاب۔

علامات۔ کوہ مین گرائی معلوم ہوتی ہے۔ نیچے گرے جانے کا سادہ ہونا ہے
شکم پھولا ہوا ہوتا ہے۔ رانوں اور رانوں کی جڑوں میں درد ہوتا ہے اندام نہانی سے
اکثر سفیدی خارج ہوتی ہے۔ لیٹا رہنے سے درد مین کمی ہو جاتی ہے۔ بار بار
پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ جب رحم سامنے کو آ جاتا ہے اور مثانہ پر دباؤ پڑتا
ہے تو مریضہ پیشاب نہیں کر سکتی اس طرح پر جب رحم پیچھے کو ہٹتا ہے تو امعاء مستقیم پر

خوش

اور ہاگ

ہے

ہے

بانیون

قاعدہ

زور

ہے۔ یا

ہے۔ یا

ہے۔ یا

سیدی

ہوتا ہے

خ خون

اگر عرصہ

تین

تا ہے

یہ داشت

ت اگر ہو تو

ریضہ کو

دالین

دیاؤ پڑتا ہے اور قیض ہو جاتا ہے جس قدر رحم اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اس قدر علامات شدید ظاہر ہوتی ہیں رحم کے دوران خون میں رکاوٹ ہونے سے رحم میں کسیدہ راجحہ خون ہو جاتا ہے رحم کے ٹل جانے کا مضر اثر آلات لہضم پر پڑتا ہے اور جگر اور معدہ بھی شریک مرض ہو جاتے ہیں اور ان کے سبب نظام اعصاب پر اثر پڑتا ہے جس سے ضعف ہو جاتا ہے اور مریضہ کی عام صحت خراب ہو جاتی ہے۔ رحم کا ٹل جانا عسرت الحیض کیسا سخت شریک ہو جاتا ہے اور نیز رحم کے رحم جیمین اندام نہانی سے رطوبت خارج ہوتی ہے اس مرض میں شامل ہو جاتا ہے۔ پچھلے دو نوں امراض کی شرکت سے عورت باجگہ ہو جاتی ہے۔

علاج۔ رحم کے ہٹ جانے کی مقدار پر منحصر ہے۔ اگر مرض خفیف ہے تو ادویہ ذریعہ طاقت کو درست کریں اور یہ نسخہ دیں۔ کوئین۔ ۲۴ گرین کو عرق لیمون میں حل کر کے آٹھ اونس پانی میں ملا کر ایک ایک وٹس دن میں تین مرتبہ پلا دیں۔ جمیع خون کو روکیں مریضہ کو عرصہ تک پلنگ پر چیت لٹائے رکھیں۔ اور ایک پائینٹ (وٹس چھٹا تک) سرد پانی میں ایک ڈرام کانڈی فلوئڈ ملا کر مریضہ کو نصف بیٹھا اور قیض لپٹا کر کے بندریچہ چکاری اندر داخل کریں اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو ۲ گرین ہٹکری کو آٹھ اونس پانی میں ملا کر چکاری کریں یا نصف اونس چاکر کو ایک پائینٹ کھولتے ہوئے پانی میں بھگو کر پلنگ چھان کریں اور جب سرد ہو جاوے تو اسکی چکاری لگاویں یا سفینٹ آف زنک۔ ۲ گرین ٹینچر اویا ای یا قطرے آٹھ اونس پانی میں ملا کر چکاری لگائیں اگر مرض عسرت الحیض ہو تو اسکا علاج کریں مریضہ امراض کے ساتھ اکثر فتور ہا صمہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ نسخہ دیں۔

ڈیلیوٹ ٹیکرک ایسڈ۔ ایک ڈرام Dilute Nitric acid

ڈیلیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ ایک ڈرام Dilute Hydrochloric acid

شیرجہنجر ایک رام
 Sincture ginger 1 dr
 water 8 oz
 one 3 for a dose, to be taken 3 times a day
 before meals
 سب کو ملا کر ایک ایک اولش

دو تین مرتبہ قبل از غذا پلاوین اور پیپ سین کھانیکے ساتھ دیوین بعد غذا سوڈا اور
 پیپر منٹ وائر ملا کر پلاوین اگر رحم زیادہ ہٹ گیا ہو تو لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کراوین تاکہ رحم کو
 دست کاری سے درست کر دے۔

رحم کا زخم

دھن رحم یا قریب ہن رحم کے زخم ہو جاتا ہو کہ یہی یہ زخم صرف خراش ہوتا ہے اور کوئی گہرا
 اور کبھی بے ضرر اور کبھی خراب قسم کا ہوتا ہے۔

اسباب۔ رحم کے اندر دو الکی بتی ٹھیک طور پر نہ کہنے سے یا عرصہ تک کہی رہنے
 مگر زیادہ تر مرن سوزش رحم اور رحم کے ٹپانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات۔ ان امراض کے موافق ہوتی ہیں جنکے سبب یہ مرض ہوا ہے یعنی مرن
 سوزش رحم اور رحم کے ٹپانے کی علامات بائیمجائی ہیں اور بلا امتحان ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ
 رحم میں زخم ہے یہ مرض بلا شرکت امراض مذکورہ بالا تنہا نہیں ہوتا اور اگر ہو تو بلا علاج
 صحت ہو جاتی ہے جیسا امراض مذکورہ شریک ہوں تو انکا علاج کیا جائے نہ صرف
 زخم کا۔ اندام ہنائی سے خون امیز مواد خارج ہوتا ہے اور اگر مرض زیادہ شدید ہو تو خون کے
 لوتہڑے نکلتے ہیں۔

علاج۔ پٹگری کے عرق یا کانڈی فلوئیڈ کے عرق کی پچکاری سے چند روز میں آرام
 ہو تو لیڈی ڈاکٹر کو ملاحظہ کراوین۔

شدید

دن

ریک

ہو جا

تھ

تا ہے

تا

بویہ

مین

نجام

بٹ

سف

ٹش

ٹے

فیٹ

آین

نمہ

۵۷

۵۸

پلیوروڈینیا

کمزور عورتوں کو اکثر بائیں پہلو میں درد ہوتا ہے۔
اسباب کئی خون۔ نفخ شکم فتور ہاضمہ احتباس خون حیض سفید رطوبت کا اندام
نہانی سے خارج ہونا نازک مزاجی عصبی درد وغیرہ
خفیف قسم کے ذات الجنب سے اس کا مبالغہ ہو جاتا ہے جسکی تشخیص اس طرح کرتے ہیں۔

پلیوروڈینیا	ذات الجنب
۱۔ عورتوں کے بائیں پہلو میں ہوتا ہے	۱۔ عورت اور مرد دونوں کے پہلو میں ہو سکتا ہے
۲۔ بخار نہیں ہوتا۔	۲۔ بخار ہوتا ہے۔

اور عضلاتی درد سے چون تشخیص کرتے ہیں کہ عضلاتی درد میں درد پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے
اور حرکت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔
علاج۔ رائی کا پلاسٹر دونوں کو مفید ہے علاوہ اسکے اس مرض میں مرکبات فولاد
اور شکمیا نہایت مفید ہیں۔

سرطان پستان

ادھر عمر کی عورتوں کے پستان میں سرطان ہو جاتا ہے۔
علامات۔ شروع میں جلد کے نیچے چھوٹی سی سخت رسولی یا گٹری معلوم ہوتی ہے۔
جس میں درد نہیں ہوتا کچھ عرصہ بعد اس رسولی میں نشتر چھو نیکا تیز درد ہونے لگتا ہے
رفتہ رفتہ یہ رسولی پستان کی ساخت میں پھیلی جاتی ہے۔ اور بڑھتی ہے کچھ آتی ہے
جب تک سرطان کی رسولی ہلانے سے پہلے اور قبل کی گلیٹون میں ورم نہ آیا۔ اس وقت

تک شگاف دیکر سرطان نکال دینے سے اکثر آرام ہو جاتا ہے۔ اور جب سرطان میں زخم ہو جاوے تو صحت کی امید کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ فی زمانہ سرطان کیواسطے بہت سی ادویہ ایجاد ہوئی ہیں۔ مگر عمل جراحی کے سوا کوئی ایسی دوا نہیں جو اسکی بیج کٹی کر کے بعد نکالنے کے بھی یہ مرض یا تو پستان میں یا جسم کے کسی اور مقام میں ہو جاتا ہے۔

پستان کی رسولی سے یہ فرق ہو

سرطان	پستان کی رسولی
۱۔ ۳۵ سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے۔	۱۔ ۳۵ سال کی عمر سے پہلے ہوتی ہے۔
۲۔ پستان کی جلد اور ساخت میں جڑ جاتا ہے۔	۲۔ پستان کی جلد اور ساخت میں نہیں جڑتی
۳۔ پستان کی ریشمی کچ آتی ہے۔	۳۔ پستان کی ریشمی نہیں کچتی۔
۴۔ برہمی لگنے کا شدید درد ہوتا ہے۔	۴۔ گود درد شدید ہوتا ہے مگر برہمی چبے کا سامنہ نہیں ہوتا۔
۵۔ اکثر زخم ہو جاتا ہے۔	۵۔ اکثر زخم نہیں ہوتا۔
۶۔ بغل کی گلیٹھون میں دم آجاتا ہے۔	۶۔ بغل کی گلیٹھون میں دم نہیں ہوتا۔
۷۔ عام صحت خراب ہو جاتی ہے۔	۷۔ عام صحت خراب نہیں ہوتی۔
۸۔ خود کرتا ہے۔	۸۔ شاذ و نادر عود کرتی ہے۔
۹۔ شروع میں پستان پر چھان ہو جاتا ہے۔	۹۔ چھان نہیں ہوتا۔

تمام شد

کاندام

تے ہیں۔

وین ہو سکتا

ہوتا ہے

ت فولاد

نی ہر

تالے

تی ہے

وقت

اوزان و پیمانہ

اوزان ہندی	اوزان انگریزی	
$\frac{1}{4}$ رتی $\frac{1}{16}$ ماشہ $\frac{1}{4}$ ماشہ $\frac{1}{2}$ تولہ $\frac{3}{4}$ تولہ یا ڈیڑھ پاؤ	ایک اسکرویل ایک ڈرام ایک اونس ایک پونڈ	اکرین ۲۰ گرین ۳۱ اسکرویل ۸ ڈرام ۱۲ اونس
	پیمانہ سیال اشیاء	
$\frac{1}{4}$ ماشہ $\frac{1}{8}$ ماشہ سوا تولہ ایک چھٹانک	ایک ڈرام ۲ ڈرام ۴ ڈرام ۲ اونس	ایک ٹی اسپون فل ایک ڈیزلٹ اسپون فل ایک ٹیبل اسپون فل چھوٹا مین گلاس فل
پیمانہ ہندی	پیمانہ سیال اشیاء انگریزی	
$\frac{1}{4}$ رتی $\frac{1}{16}$ ماشہ $\frac{1}{4}$ تولہ $\frac{1}{2}$ پاؤ ۵ سیر	ایک گزین ایک ڈرام ایک اونس ایک پائینٹ ایک گالن	قطرہ ۴۰ قطرے ۸ ڈرام ۲۰ اونس ۸ پائینٹ

قاعدہ خوراک دویہ موافق عمر مریض

عمر	بڑی خوراک ایک اونس	بڑی خوراک ایک ڈرام	بڑی خوراک ایک اسکروپل یا ۲۰ گرین
ایک ماہ	۲۴ گرین	۳ گرین	ایک گرین
۶ ماہ	۲ اسکروپل	۵ گرین	۱-۳ گرین
ایک سال	ایک ڈرام	۸ گرین	۲-۴ گرین
۲ سال	۱/۴ ڈرام	۹ گرین	۳ گرین
۳ سال	۱/۲ ڈرام	۱۴ گرین	۴ گرین
۵ سال	۳ ڈرام	۲۰ گرین	۶ گرین
۱۰ سال	۴ ڈرام یا نصف اونس	۱/۲ ڈرام	۱۰ گرین
۱۲ سال	۵ ڈرام	۱۴ گرین	۱۲ گرین
۱۵ سال	۶ ڈرام	۱۷ گرین	۱۶ گرین
۲۰ سال	۷ ڈرام	۵۰ گرین	۸ گرین
۲۱ سال	ایک اونس	ایک ڈرام	ایک اسکروپل یا ۲۰ گرین

اس نقشہ خوراک کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک دوا کی مقدار خوراک ۲۱ سال کی عمر کے شخص کے واسطے ایک اونس ہے تو ایک ماہ سے اوپر اور چھ ماہ کے اندر کے بچے کے واسطے اس دوا کی ۲۴ گرین خوراک ہوگی اور اگر دوا سیال ہے تو ۲ قطرے خوراک ہوگی۔

اگر بچہ کی عمر پانچ سال سے اوپر ہے تو دو ڈرام خوراک ہوگی۔ اور دس سال سے

زائد عمر کے بچہ کے واسطے نصف اونس خوراک ہوگی۔
 یا اگر ایک اسکرپل بڑی خوراک ہے یا دو ایال ہے اور ۲۰ قطرے بڑی خوراک
 توات برس کے بچہ کے واسطے سات گرین یا سات قطرے ہوگی۔
 اور اگر دو ایال ہے اور بچہ ایک ماہ کا ہے تو ایک قطرہ خوراک ہوگی اور اگر دو
 خشک ہے تو ایک گرین ہوگی یہ نقشہ خوراک ادویہ تندرست اور قوی بچوں
 کے واسطے ہے۔

اگر بچہ کمزور ہے۔ تو دوا کی مقدار بھی کم ہونا چاہیے۔ جیسے ایک سال کے کمزور بچہ
 کے واسطے ۱۶ حصہ دوا کم کر دیا جاوے اور ایک سال سے دس سال تک کے
 کمزور بچہ کے واسطے ۱۶ حصہ کم کر دیا جاوے۔



NOT TO BE ISSUED

Checked
1987

اعلان

کاپی رائٹ اس کتاب صحت النساء کا بحق مصنف بذریعہ حبشری محفوظ

المراقم

سید عزیز الدین - ڈاکٹر پنشنر ماہ و مہیر

اشتہار

یہ کتابیں خاکسار مؤلف کی تالیف سے ہیں اور ہر ایک کتاب عزیز الوجود ہے جن صاحب کو
خریدنا منظور ہو وہ مولف سے ذیل کے پتہ سے طلب فرماویں۔

محافظ الصبیان - جس کی خوبیاں نام سے ظاہر ہیں۔ آج تک اس طرح
کی کتاب سہل و آسان طریقہ سے علاج ڈاکٹری میں نہیں لکھی گئی۔ عام فہم ہے اور ہر طبیب
لکھا اپنے بچے کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ جدید تالیف ہے جو ذہن حال کے کل ضرورتوں کو
حاوی ہے قیمت فی جلد مع محصول ڈاک و فیس مئی آڈر وغیرہ۔
توضیح الولادة - یعنی اردو ملڈ و ایفری فن قابلہ میں مع تصاویر قیمت مع
محصول ڈاک وغیرہ

اردو میڈیکل جورس پر ڈیٹس - مع تصاویر اس میں بہت سے ضروری و کارآمد
امور درج ہیں۔ قیمت فی جلد مع محصول وغیرہ

صحت النساء عورتوں کے کل امراض کا بیان اور اسکا علاج بہت سہل و آسان طریقہ
سے لکھا گیا ہے یہ کسی جدید تالیف سے اور زیادہ عالیشان و جدید واقعات پیش آئے ہیں وہ سب پیش
نظر رکھے ہیں۔ یہ کتاب بھی ڈاکٹری علاج میں بے مثل اور عام فہم ہے قیمت فی جلد مع

ڈاکٹر سید عزیز الدین

ہیڈ کوارٹر فہرست و حجامہ شعلہ رنگ ڈاکھانہ پری